



UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO

FACULTAD DE CIENCIA DE LA SALUD

CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

**Conocimiento y actitud sobre anticonceptivo oral de emergencia en
colaboradores de droguerías de Capón Center en Cercado de Lima-2023.**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE PROFESIONAL DE QUÍMICO
FARMACÉUTICO**

AUTOR:

Bach. Briceño Pastor, Sixto Federico (Orcid.org/0009-0006-9768-9917)

ASESOR:

Mg. Alvarado Figueroa, Marco Antonio (Orcid.org/0000-0002-9034-9788)

LINEA DE INVESTIGACION

Farmacología

LIMA-PERU


2023

CONSTANCIA DE SIMILITUD



Av. Bolivia 626 - Breña
Teléfono: 719 7799
informes@unid.edu.pe
www.unid.edu.pe

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO EXPONENCIAL - UNID			
RESULTADOS DE SIMILITUD			
NOMBRE DEL PROYECTO	Conocimiento y actitud sobre anticonceptivo oral de emergencia en colaboradores de droguerías de Capón Center en Cercado de Lima-2023		
FACULTAD	FARMACIA Y BIOQUIMICA		
FECHA DEL INFORME	28/08/2023		
INTEGRANTES	<table border="1"><thead><tr><th>APELLIDOS Y NOMBRES</th></tr></thead><tbody><tr><td>BRICEÑO PASTOR SIXTO FEDERICO</td></tr></tbody></table>	APELLIDOS Y NOMBRES	BRICEÑO PASTOR SIXTO FEDERICO
APELLIDOS Y NOMBRES			
BRICEÑO PASTOR SIXTO FEDERICO			
RESULTADO DE SIMILITUD	<table border="1"><thead><tr><th>RESULTADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aprobado</td></tr></tbody></table>	RESULTADO	Aprobado
RESULTADO			
Aprobado			
22%			


RECTOR

DEDICATORIA

Quiero dedicar desde los más profundo de mi ser y de mi alma este trabajo de investigación a mi Dios que habita en el tercer cielo rodeado de una corte de millares de ángeles y de su hijo amado Jesucristo quien es el Rey de reyes y Señor de señores según las santas escrituras el que ha sido la fuente de mi inspiración y conocimiento que se me otorgado y también quiero extender mi dedicación este trabajo a mi entorno familiar el cual yo consideró una de las pieza fundamental en la etapa de mi vida y que a su vez ha sido soporte en lo moral, anímico y fortaleza en cada día de mi existencia.

Sixto Briceño Pastor.

AGRADECIMIENTO

En primer lugar, quiero agradecer a mi padre celestial el Dios de Jacob por su gracia, su infinito amor y su inmensa misericordia porque solo a él le debo que cada mañana pueda ver la luz del día y que mi vida se siga prolongando en esta hermosa tierra llena de gloria. también deseo agradecer a mi familia en especial a mi madre está en el cielo, a mi padre, mis hermanos y en especial a mi hermana Virginia que me ha servido de gran apoyo de ayuda, fortaleza, paciencia y perseverancia en que yo pueda concluir con éxito los estudios académicos.

También agradecer de una muy especial a todos los profesores de la institución universitaria por transmitirme sus conocimientos en las diversas materias, por su paciencia durante la etapa de mi aprendizaje y por último agradecerles a todos mi compañero que fueron y son parte de mi familia por compartir momentos inolvidables como sus deseos de seguir creciendo profesionalmente y anhelos durante el tiempo de estancia en las aulas universitaria.

Sixto Briceño Pastor.

ÍNDICE DE CONTENIDO

CONSTANCIA DE SIMILITUD.....	II
DEDICATORIA.....	III
AGRADECIMIENTO.....	IV
ÍNDICE DE CONTENIDO.....	V
ÍNDICE DE TABLAS	VII
ÍNDICE DE FIGURA	VIII
RESUMEN.....	IX
ABSTRACT	X
I. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1 Descripción de la realidad problemática	3
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA.....	6
1.2.1 Problema general	6
1.2.2 Problema específico	6
1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION	7
1.3.1 Objetivo general	7
1.3.2 Objetivo específico	7
1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION.....	7
1.4.1 Justificación teórica	7
1.4.2 Justificación Social	8
1.4.3 Justificación Metodológica	8
II. MARCO TEORICO.....	9
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	9
2.1.1 Antecedentes Internacionales.....	9
2.1.2 Antecedentes Nacionales.....	11
2.2 BASES TEÓRICAS.....	13
2.2.1 Conocimiento	13
2.2.2 Actitudes.....	14
2.2.3 Anticoncepción oral de emergencia.....	15
2.2.4 Tipos de anticonceptivo oral de emergencia y dosificación.....	17
2.2.5 Anticonceptivo oral de emergencia en el Perú	20
2.2.6 Norma técnica de planificación familiar.....	21
2.3 MARCO CONCEPTUAL	22

2.4	HIPOTESIS	23
2.4.1	Hipótesis general	23
2.4.2	Hipótesis específico	23
III.	METODOLOGIA	24
3.1	Tipo de investigación	24
3.2	Enfoque y diseño	24
3.3	Variables	25
3.3.1	Variables independientes	25
3.3.2	Variable dependiente	25
3.4	Población y muestra	25
3.5	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	27
3.6	Técnica de procesamiento y análisis de datos	27
3.7	Criterio ético y rigor científico	27
IV.	RESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS	28
4.1	Presentación de resultados	28
4.2	Prueba de hipótesis	34
4.2.1	hipótesis General	34
4.2.2	Hipótesis Específica 1	35
4.2.3	Hipótesis Específica 2	36
4.2.4	Hipótesis Específica 3	37
4.2.5	Hipótesis Específica 4	38
V.	DISCUSIÓN DE RESULTADOS	39
VI.	CONCLUSIONES	43
VII.	RECOMENDACIONES	44
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	45
	ANEXOS	58

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Presentación de intervalo de la variable X (Conocimiento).....	28
Tabla 2. Presentación de intervalo de la variable Y(Actitud)	28
Tabla 3. Frecuencia sobre el nivel de conocimiento.....	29
Tabla 4. Frecuencia sobre la estimación de la actitud.	30
Tabla 5. Frecuencia sobre la dimensión Cognitiva	31
Tabla 6. Frecuencia sobre la dimensión Afectiva	32
Tabla 7. Frecuencia sobre la dimensión Conductual.....	33
Tabla 8. Correlación entre el conocimiento y la actitud sobre anticonceptivos.....	34
Tabla 9. Correlación entre la actitud y la definición sobre anticonceptivos	35
Tabla 10. Correlación entre la actitud y el uso del anticonceptivo.	36
Tabla 11. Correlación entre la actitud y la eficiencia sobre anticonceptivos.	37
Tabla 12. Correlación entre la actitud y los efectos secundarios	38

ÍNDICE DE FIGURA

Figura 1. Frecuencia sobre el nivel de conocimiento	29
Figura 2. Frecuencia sobre la estimación de la actitud	30
Figura 3. Frecuencia sobre la dimensión Cognitiva	31
Figura 4. Frecuencia sobre la dimensión Afectiva	32
Figura 5. Frecuencia sobre la dimensión Conductual	33

RESUMEN

El presente estudio tiene la intención de entender la correlación de las variables conocimiento y la actitud en los anticonceptivos orales de urgencia en colaboradores en las droguerías de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023. Metodología: la investigación fue de tipo básico, con diseño descriptivo-correlacional y no experimental. Muestra: se constituyó por 134 colaboradores de droguerías de Capón Center en Cercado de Lima 2023. La técnica: fue una encuesta y como herramienta fueron dos cuestionarios; uno para saber el nivel de conocimiento y otro para conocer la actitud con preguntas con respuestas a elegir. La recopilación numérica fue mediante el programa Microsoft Excel y sometido al estadístico SPSS 25 para su análisis. Resultados: se logró tener un coeficiente de correlación de $r= 0,027$ con una $p=0.754(p>0.05)$ con lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. De manera que, se logra demostrar que estadísticamente no guarda ninguna relación significativa entre conocimiento y actitud. así mismo se logró conocer que un 53.3% tienen conocimiento alto, 23.1%, conocimiento medio y 23.1 conocimiento bajo, en relación a la actitud se obtuvo 52.2% de aceptación y un 23.9% de rechazo sobre anticonceptivo oral de emergencia. Conclusión: se conoció que no guarda ninguna correlación estadísticamente significativa entre ambas variables sobre píldoras oral de emergencia en los colaboradores de las droguerías de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023.

Palabras claves: Conocimiento, actitudes, píldora de emergencia, droguerías.

ABSTRACT

The present study intends to understand the correlation of the knowledge and attitude variables in emergency oral contraceptives in collaborators of the drugstores of the capon center gallery in the district of Cercado de Lima-2023. Methodology: the research was of a basic type, with a descriptive-correlational and non experimental desing. Sample: it was up of 134 collaborators from capon center drugstores in Cercado of Lima-2023. The technique: it was a survey and the tool was two questionnaires; one to know the level of knowledge and another to know the attitude with questions with answers to choose from. The numerical compilation was throuhg the Microsoft Excel program and submitted to the SPSS 25 statistic for analysis. Results: it is posible to correlation coefficient of $r= 0.0027$ with a $p= 0.754(p>0.05)$ with which the null hypothesis is accepted and the alternate hypothesis is rejected. So, it is posible that statistically there is no significant relationship between knowlwdge and attitude. Likewise, it was possible to know that 53.7% have high knowledge, 23.2% médium knowlwdge and 23.1% low knowledge, in relation to the attitude, 52.2% acceptance and 23.9% rejection of emergency oral contraceptives were obtained. Conclusión: it was know that there is no statically significant correlation between both variables emergency oral contraceptives in collaborators of the drugstores of the capon center gallery in the district of Cercado de Lima-2023.

Keywords: knowlwdge, attitude, emergency contraception, pregnancies.

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe de esta investigación abordo el tema sobre conocimiento y actitud acerca del anticonceptivo oral de emergencia, como bien es sabido son método que solo se usan en situaciones extremas, después del acto sexual sin medidas de protección.

El embarazo no deseado es uno de factores desencadenante para el aborto clandestino, se han transformado en un terrible problema sanitario a escala mundial. A medida que los años transcurren, se crean nuevas tendencias, como el feminismo, la ideología de género y la revolución sexual despertando entre los jóvenes el deseo de iniciarse una vida sexual prematura, originando como consecuencia el aumento considerable de los embarazos no planificados constituyéndose como factor de riesgo para el sistema sanitario y para el beneficio de la población.

El anticonceptivo oral de urgencia viene hacer una formula farmacéutica que ha sido elaborado para que la mujer prevenga los efectos producidos por las relaciones coitales sin haber usado ningún método de prevención evitando los embarazos no deseados que suelen ocasionar problema de salud comunitaria.

El anticonceptivo oral de emergencia fue recomendada por la organización mundial de la salud(OMS) en la agenda intercontinental, como un derecho a la salud reproductiva y también en nuestro país reciente fue aprobado el uso libre y gratuito de las píldoras de emergencia en los establecimiento de salud a nivel nacional, después de una intensa lucha jurídica contra los colectivos Profamilia representados por la sociedad civil y grupos religiosos , ante ellos el tribunal constitucional con la resolución N° 00238-2021-PA/TC donde se estableció su libre distribución de las píldora anticonceptivas.

La píldora oral de emergencia son métodos que están incluidos dentro del programa de planificación familiar, solo debe ser usado en situaciones excepcionales de urgencia y no debe ser usada como un método de uso regular, ya que existe una serie de complicaciones en las mujeres como irregularidades menstruales y otras reacciones adversas. Dentro de los participantes en general

se encontró una situación alarmante y esta expuestos a todos estos eventos adversos por el escaso conocimiento y la poca información del método.

Los colaboradores de las droguerías de la galería de capón center quienes se encuentran laborando en este establecimiento donde se comercializa productos farmacéuticos y afines no están distante a esta penosa realidad, por lo que se convirtieron en partícipes del tema teniendo en cuenta en sí, ya los puntos más relevantes descrito donde se profundizo el aborto como un problema de sanitario en mujeres por lo cual urge la necesidad de saber el conocimiento y la actitud que presentan dichos participantes.

El presente trabajo elaborado con la información obtenida permitirá que los colaboradores de la galería de capón centren puedan mejorar su nivel de conocimiento sobre anticonceptivo oral de emergencia, en relación a uso correcto y con ello permitirá con ellos mejorar el nivel de vida entre las usuarias.

Por lo expuesto anteriormente, el propósito que nos ofrece esta investigación es la saber el grado de relación entre conocimiento y actitud sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023.

1.1 Descripción de la realidad problemática

Los anticonceptivos de emergencia se perfilan como los métodos de anticoncepción utilizados durante los primeros días del coito sexual (Hashem et al., 2022), por lo que también se le conoce como la poscoital o pastilla del día siguiente. Los anticonceptivos de emergencia (AE) son métodos de anticoncepción de las últimas décadas calificados por la ciencia médica como medicamentos anticonceptivos modernos, seguros y terapéuticamente eficiente (Mesfin, 2020).

La Organización Mundial de la Salud (Organizacion Mundial de la Salud, 2019) en sus artículos señalan que el uso indiscriminado de las píldoras anticonceptivas orales de emergencias en las mujeres genera efectos secundarios casi parecidas a otros tipos de anticonceptivos orales como náuseas, emesis, sangrado uterino, cefaleas controlables y cansancio. todos estos efectos adversos son tan habituales, leves y normalmente sin que la afectada reciba algún tipo de prescripción farmacológica.

Para Leelakanok et al.,(2022) ellos indican que el levonorgestrel y el acetato de ulipristal son dos de los métodos anticonceptivos orales de emergencia [COE] más usados, pero han observado en la población un alarmante índice de falta de conocimiento en relación a su uso adecuado y su actitud negativa hacia los EOC. La falta de conocimiento sobre las opciones anticonceptivas, los conceptos erróneos sobre los efectos secundarios y la escaza información sobre el uso eficaz de los métodos de urgencias son áreas de oportunidad para la intervención de los profesionales de salud (Walker et al., 2019).

Según Tshitenge et al., (2018) señala que la problemática de salud mundial en que se ha convertido el embarazo no planificado, según revelados los datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud [OMS], donde ascendieron a 20.000 menores de 18 años que dan a luz la vida de un ser humano alrededor del todo el mundo. También la misma entidad (OMS) estima que cada año, casi 5,5 millones de mujeres en el África son sometidas a abortos clandestino donde, el 59% de todos los abortos inseguros en África se realizan entre mujeres entre 15 a 24 años (Mishore et al., 2019).

En el panorama mundial, se estima que 74 millones de mujeres que habitan en las naciones de ingresos bajos y mediano, presentaron embarazos no planificados cada año, asimismo este problema genera que alrededor de 25 millones de abortos clandestinos y 47.000 muertes de gestantes anualmente, de manera que los anticonceptivos de emergencia (AE); son un método utilizado como alternativa para controlar el embarazo después del coito sexual sin medidas de prevención, logrando reducir el avance de embarazo no planificado hasta en un 95 % cuando se toman dentro de las 72 horas después del acto sexual (Kwame et al., 2022).

En España se considera que alrededor del 30-50% de las personas que han usado PAE y el nivel de conocimiento entre la población menor de 30 años sobre este medicamento es baja, lo que ha permitido que en los últimas décadas a través del gobierno se permita la distribución de la PAE, ya desde el año 2009 se pueda expender en las farmacias sin receta médica para LNG y desde el año 2015 se permite el acceso al medicamento aunque el único inconveniente en el acceso a estos medicamentos es que no es cubierto por el estado sino por el consumidor ya que además se tendrá la información sobre su uso, efectos y manejo (Leon et al., 2022).

Por otro lado, Toerien et al., (2019) en República de Sudáfrica, afirma que el conocimiento sobre la píldora oral de emergencia es bajo entre la población y su uso está cuestionado, debido a que los regímenes para la anticoncepción de emergencia implican altas dosis carga hormonal en AOC y sus riesgos adversos ante su administración. En Arabia Saudita, una nación arraigada entre su cultura y religiosidad, la actitud de su población sobre el uso del método anticonceptivo existe una serie de factores que limitan la información al medicamento sobre su utilización entre los cuales están sus creencias, las normas de convivencias de la comunidad, como el rechazo a los efectos adversos, la falta de información, el costo y acceso a la anticoncepción de emergencia (Karim y otros, 2021).

En América Latina, Castro et al., (2019) destaca en su estudio que las actitudes evidencian cómo el individuo enfrenta determinadas experiencias, que influyen en su conducta sexual. también es necesario tener en cuenta la importancia de conocer pertinentemente, sobre la anticoncepción oral de

emergencia (AOE) y relación con las actitudes que manifiestan entre los profesionales de la farmacia de la comunidad son un requisito vital para el acceso oportuno a las PAE, lo que en última instancia disminuye la tasa de embarazos no deseados en las mujeres (Shakya et al., 2020).

En Chile, el aumento de embarazos no planificado y abortos de manera ilegal, la enseñanza en las escuelas sobre enfoque de sexual y salud reproductiva entre la comunidad ha permitido mejorar el nivel de conocimiento sobre todo en mujeres sobre el uso correcto de las AE, está contribuyendo en toma de conciencia la manera de reducir la tasa de embarazos no planificado (Abarzúa et al, 2021).

En nuestro país, Chapa et al., (2019) señalaron que el estado peruano promulgo entre los años 1999 – 2001 como Política Nacional la inclusión de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE); sin embargo, por rechazo y disputas con sectores radicales que se manifestaron en contra de dicha propuesta que a su vez reclamaban que se trataba una píldora asesina, también dicha resolución ministerial se daba por aprobada la distribución , comercialización de los anticonceptivos oral de emergencia como medio alternativo al paquete de planificación de los embarazos, donde hasta el 2016 no se había logrado distribuir el producto de manera sostenida debido a los procesos judiciales que lo impedían (Ministerio de salud, 2019).

Por otra parte por orden resolutive N°652-2016 MINSA da por sentada la Norma Técnica del Programa Planificación Familiar, donde se detalla y definen que la anticoncepción de emergencia es un medio que será usado como método alternativo y solo en caso de que se amerite su consumo, con el propósito de prevenir un embarazo no planificado, además su dosificación en nuestro país son las medicamentos que contienen levonorgestrel (una tableta de 1.5mg o dos tabletas de 0.75mg, o la combinación del etinilestradiol+levonorgestrel 30 mg+150 mcg: método Yuzpe) (Báldarrago, 2021).

En los últimos años en nuestro país el 88% de mujeres adolescentes en edad fértil tuvieron actividades sexuales , otro dato importantes es que el 90.4 % de mujeres arrojaron que tienen un conocimiento equivocado acerca del método de anticoncepción de emergencia , otro 67.6% de las mujeres usaron algunas vez

dicho método y el 45.8% de mujeres probaron este método en los últimos meses y otras mujeres tienen predisposición al consumo frecuente exponiéndose en ocasiones a los efectos adversos por el uso medicamento de anticonceptivo (Guillen, 2019)

A nivel local en la ciudad de Lima Metropolitana se registró durante el año 2016 donde se constató que las dos terceras partes de mujeres en edad fértil entre la población de nivel socioeconómico elevado habían consumido al menos por única vez la píldora oral de emergencia, y la otra parte lo había hecho en los últimos meses del año (Del Rosario, 2019).

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

1.2.1 Problema general

¿Cómo el conocimiento se correlaciona con la actitud sobre anticonceptivo oral de emergencia en los colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023?

1.2.2 Problema específico

- ¿Cómo se relaciona la actitud con la dimensión definición sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023?

- ¿Cómo se correlaciona la actitud con la dimensión uso sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023?

- ¿Cómo se relaciona la actitud con la dimensión eficacia sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima?2023?

- ¿Cómo se relaciona la actitud con la dimensión reacciones secundarias sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023?

1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION

1.3.1 Objetivo general

. Conocer como el conocimiento se relaciona con actitud sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023.

1.3.2 Objetivo específico

. Conocer la relación entre la actitud y la dimensión definición sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023.

. Conocer la correlación entre la actitud y la dimensión uso sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023

. Conocer la relación entre actitud eficacia sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023.

. Conocer la relación entre actitud y la dimensión reacciones secundarias sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023.

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

1.4.1 Justificación teórica

Este informe busco originar nuevas bases de información acerca nivel de conocimiento que existe en los colaboradores de este establecimiento farmacéutico tienen referido a los anticonceptivos oral de emergencia y su vinculación con la actitud de las personas ,ya que a la información y promoción muchos los ven como un método regular y no como un método usado solo en situación de emergencia, se indica que al término de la investigación se obtuvo los resultados para luego usarlos como pruebas y posteriormente confrontando con otros estudios ya que la realidad social en cada lugar son distintas.

1.4.2 Justificación Social

Por medio de esta investigación se pudo identificar determinar y establecer la correlación entre conocimiento y la actitud sobre los anticonceptivos de emergencia, dado que continúa como problemática de salud pública, este vínculo desempeña un papel importante ya permite los colaboradores deben conocer sobre su correcto uso, los efectos adversos, para evitar el uso incorrecto y lo que se logro fue la medición de ambas variables si existe o no relación.

1.4.3 Justificación Metodológica

Para la obtención de los datos de información de los participantes el investigador se valió del uso de la técnica de encuesta de manera personal, y como instrumento dos cuestionarios, antes de su aplicación dicho métodos han cumplido con la medida de idoneidad y confiabilidad durante su preparación, con ello se pueda medir el grado de conocimiento con la variable actitud. así mismo este instrumento puede ser adaptado y adecuada para investigaciones posteriores.

II. MARCO TEORICO

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1 Antecedentes Internacionales

Alharbi et al.,(2019), los autores en su investigación tienen como propósito de analizar el conocimiento, la actitud y la práctica de la AE en féminas saudíes en edad fértil. Siendo el método un estudio descriptivo de corte transeccional utilizando como herramienta un cuestionario donde se encuestaron a mujeres en edad fértil (18 a 45 años). En cuanto a su análisis de variable se usó la prueba no paramétrica de Chi-cuadrado de Pearson. Los resultados incluyeron a 370 de 525 (70,5%) mujeres, con una edad media de $32,3 \pm 6,3$ años. De estos, 117 (31,6%) tenían conocimiento de cómo precaver el embarazo después de tener relaciones coitales desprotegidas, 37 (59,7%) aseguraron también que ambas parejas deberían decidir sobre el uso de AE. La investigación concluyó que, entre las mujeres saudíes, el conocimiento, la conciencia y el uso de la AE siguen siendo bajos, aunque existe una actitud positiva para el uso venidero de la AE.

Rodrigues et al.,(2022), Los autores en su trabajo de investigación proponen determinar la actitud, la vivencia, el nivel de conocimiento y las fuentes de información sobre la anticoncepción de emergencia mujeres portuguesas del servicio de salud. El método fue observacional, transeccional y multicéntrico en una muestra de 280 mujeres portuguesas. El instrumento fue a través de un cuestionario validado. Los resultados hallados de la porción determino que el 27,7% empleaban AE, el 50% de los cuales sin ninguna orientación. Teniendo en cuenta que el 92,1% de las usuarias indicaron tener conocimientos sobre anticoncepción, solo el 31,2% de ellas. luego un (67,5%) manifestaron que los anticonceptivos de emergencia se relacionan a diversos efectos secundarios. Los autores concluyeron que en las usuarias de los servicios sanitarios sabían de la existencia de la anticoncepción de emergencia, pero evidenciaron tener rango bajo de conocimiento e información sobre Anticonceptivos de emergencia.

Yongpradern et al.,(2022), este grupo de investigadores tienen la intención de calcular el rango del conocimiento y las actitudes hacia las PAE entre alumnos universitarios de primer año en una universidad de Tailandia. El método fue un estudio descriptivo de corte transeccional, como instrumento de recopilación de

información se empleó un cuestionario validado por los expertos. Los datos obtenidos se examinaron a través de la prueba de chi-cuadrada de Pearson. Los resultados obtenidos de un total de 335 estudiantes en relación a las preguntas menos respondidas correctamente fueron sobre los regímenes de PAE y el uso de PAE en lugar de anticonceptivos orales combinados (AOC) (30,4 % y 34,9 %, respectivamente). Además, otros valores que se hallaron fueron también la experiencia en el uso de PAE y en la educación de PAE fueron factores significativos en las puntuaciones altas de conocimiento. Los autores concluyeron que el porcentaje obtenido en los estudiantes de la universidad tienen un conocimiento promedio de nivel moderado sobre PAE.

Davis et al.,(2020), los autores en su estudio tenían como finalidad analizar el conocimiento y la actitud con respecto a la AE entre universitarios del distrito de Thiruvapur, Tamil Nadu, India. Siendo el método un estudio de corte transeccional. Para la muestra se conformó de 758 alumnos por medio de la técnica de muestreo por conveniencia. Los datos se obtuvieron apoyándose de un cuestionario validado. Los resultados la mayoría (63,4%) conocían que no evitan las ET; otro dato importante arrojó que el 42,6% conocen el límite de tiempo para usar AE. El nivel de conocimiento sobre la CE fue moderado (60,1%), y significativamente ($p < 0,05$) más entre los estudiantes > 25 años. La actitud negativa hacia la EC fue del 59%. Casi el 38,8% pensaron que las AE afectaría el siguiente ciclo menstrual y un 35,5% informó que incrementará el cambio en la conducta entre los adultos. Los desarrolladores concluyeron que el nivel de conocimiento en los universitarios analizados era de tipo moderado, y en su mayoría presentaron una actitud negativa hacia la CE.

Al Metwali & Shaukat, (2022), ambos investigadores tenían el propósito de averiguar acerca de los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) de los farmacéuticos comunitarios en Irak hacia los anticonceptivos de emergencia. Siendo dicho estudio de corte transeccional. La herramienta utilizada para la recopilación de información era una encuesta mediante un formulario en línea y la muestra tuvo la participación de 212 farmacéuticos comunitarios en estudio de los cuales se hallaron que el 67,9% de encuestados comprenden edades de entre (24-29) años, el 61,8% eran mujeres, el 60% tenían menos de 5 años de experiencia,

la mayoría (73,1%), también se demostró que la mayoría de los farmacéuticos comunitarios (74%) tenían excelentes conocimientos y el 95% de ellos presentaron una actitud muy positiva. En los resultados de este estudio no hubo una relación significativa entre las características demográficas y el CAP de los participantes hacia los AE. Se concluyó que la mayoría de los participantes tenían buenos conocimientos y presentaron una actitud muy positiva.

2.1.2 Antecedentes Nacionales

huayhuarina, (2019), el autor en su estudio nos plantea averiguar la correlación que hay entre el rango de conocimiento y las actitudes sobre el anticonceptivo oral de emergencia en mujeres que frecuentan un centro de salud en la Libertad, Huancayo, 2021. La metodología que usó en su estudio tiene un criterio cuantitativo, con diseño correlacional, no experimental y de corte transeccional. La muestra tuvo la participación de 100 usuarias, mayores de 18 años, que durante su vida sexual hayan usado algún método anticonceptivo. En cuanto al instrumento se usaron dos cuestionarios validados, uno para cada variable, Los resultados se hallaron que la correlación entre las variables es inexistente, cuyo coeficiente (r) de Pearson fue igual a 0.083 y el rango de significancia bilateral tuvo un valor de 0.412, con lo que probó que la relación no es significativa. El autor concluye que no hay correlación significativa entre el rango de conocimiento y las actitudes sobre el método oral de emergencia en usuarias del centro de salud.

Pfutory,(2022), el autor en su investigación plantea evaluar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre el anticonceptivo oral de emergencias en féminas de edad fértil en el contexto Covid-19, usuarias de la Botica Jkfarma de los Olivos, Lima 2021. La metodología que se usó en el ensayo era de tipo cuantitativo, descriptivo, prospectivo y de corte transeccional. se muestreo a 88 participantes como instrumento para la encuesta se usó un formulario validado por expertos en la materia. Los resultados de la investigación: el principal motivo de su uso por contraer relaciones íntimas sin prevención 23.9%, empleándose cada 3 meses o más 34.1%. El nivel de conocimientos que arrojaron fue bueno 70.5%; tenían prácticas correctas 61.4%; y mostraron actitud positiva, 85.2%, frente al uso. El autor concluye que las usuarias de la Botica JKFARMA, poseían buen nivel de

conocimientos y presentaron una actitud favorable, frente a los motivos del uso en cuanto al método del anticonceptivo de emergencia.

Fermin & Vásquez, (2019), los autores en su trabajo de investigación nos proponen evaluar la correlación que hay entre el nivel de conocimiento y actitudes sobre la anticoncepción oral de emergencia en alumnos de la carrera de obstetricia de la Universidad Privada del Norte, 2019. La metodología del estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo con diseño correlacional y de corte transeccional. El instrumento aplicado para la recopilación de información fue mediante un cuestionario validado por experto a una población 155 universitarios, sobre conocimiento y actitudes sobre la AOE. Los resultados indicaron que el nivel de conocimiento sobre la AOE, arrojó que un 14.80% para conocimiento bajo, 72.30% presentaron conocimiento medio y un 12.90% conocimiento alto. los resultados para evaluar las actitudes sobre la AOE, se observó; actitud mala 1.30%, actitud regular 32.90% y actitud buena 65.80%. Además, se halló correlación directa baja entre el nivel de conocimiento y actitudes acerca de la AOE. ambos investigadores concluyeron que existe una relación baja entre ambas variables y a su vez significativa entre el nivel de conocimiento y actitudes sobre la AOE en los alumnos universitarios.

Aguilar & Huaccachi,(2020), los autores de esta investigación proponen establecer la relación entre conocimiento y actitudes sobre anticonceptivo oral de emergencia en mujeres que acuden al Centro Materno Infantil. La metodología del estudio tenía un criterio cuantitativo, con diseño correlacional, de corte transeccional y no experimental, la población era de 181 mujeres participantes en edad fértil, el instrumento que se usó fue un cuestionario validado por los expertos. Los resultados sobre el conocimiento sobre anticoncepción oral de emergencia: un 56.4% tuvieron conocimiento medio; 31.5% alto y 12.2% conocimiento bajo y según la actitud hacia la anticoncepción oral de emergencia 74.4 % tuvieron actitud indiferente 17.1 % actitud desfavorable, 8.8 % favorable, se encontró que hay una relación buena o positiva y significativa entre el conocimiento de anticoncepción oral de emergencia y sus actitudes. Los autores concluyeron que las mujeres de edad fértil tuvieron un conocimiento medio y una actitud de desinterés hacia

anticoncepción oral de emergencia, con una relación positiva significativa entre ambas variables.

Alvarado, (2022), el autor de este estudio nos propone identificar la relación que hay entre el nivel de conocimientos y la actitud sobre anticonceptivo oral de emergencia en los alumnos de enfermería de la Universidad Nacional de Cajamarca – Filial Jaén, 2020. La metodología de estudio era de tipo descriptivo, con diseño correlacional y de corte transeccional. La población fue de 187 alumnos matriculados en el ciclo 2020-II, lo cual se trabajó con una muestra estratificada de 126 alumnos. Se aplicó un cuestionario, donde se plasmó datos sociodemográficos y las variables, nivel de conocimientos y actitudes frente al anticonceptivo oral de emergencia. Los resultados hallados revelan el nivel de conocimientos en los alumnos es mayoritariamente medio y la actitud total y por tamaño es de desinterés. Concluyó mediante la prueba de χ^2 de Pearson, que existe una correlación significativa entre el nivel de conocimientos y actitud respecto al anticonceptivo oral de emergencia ($p < 0,05$).

Miranda et al., (2022), ellos proponen determinar la correlación entre el nivel de conocimientos, prácticas y actitudes sobre el anticonceptivo oral de emergencia (AOE) en los alumnos de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - 2021. La metodología que se usó presentó un criterio cuantitativo, observacional, descriptivo correlacional retrospectivo de corte transeccional. Para la recabar la información se utilizaron como instrumento un formulario previa validación y aplicado a 41 alumnos. Los datos fueron procesados mediante la prueba χ^2 de Pearson. Los resultados fueron que el 97.6% obtuvo un nivel de conocimientos bueno; mientras que el 2.4%, malo. Además, el 100% de los alumnos mostraron tener una actitud favorable y prácticas adecuadas. Los autores concluyeron que hubo una correlación significativa entre conocimientos, actitudes y prácticas en los encuestados.

2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1 Conocimiento

El conocimiento viene hacer el vínculo establecido entre el individuo que conoce y el objeto de exploración, en el transcurso de saber, el individuo aprehende o se adueña del objeto, luego lo incorpora y se esmera por entenderlo; también se le define al conocimiento al grupo de sabidurías recopilados a lo largo de la existencia, se trata de un cúmulo compartido por el ser humano y que se encuentra en una persistente transformación (Quintero & Zamora, 2020).

El conocimiento es considerado como el inicio de partida de todo el proceso de la investigación, y su búsqueda implica el uso de procesos sistemáticos que puedan dar respuesta a interrogantes existentes sobre un fenómeno en particular (Hurtado, 2020).

Desde remotos tiempos, el individuo siempre se ha cuestionado el mundo que lo rodea y las causas de los acontecimientos que se observa en el espacio y todos los días, así como siempre se ha propuesto por estudiar el comportamiento humano y explicar las relaciones de ellos mismos (De Hoyos, 2020).

Niveles de conocimiento

Los niveles de conocimiento se encuentran clasificados en tres niveles: conocimiento alto, conocimiento medio y conocimiento bajo.

Conocimiento Alto. Referido al avance incalculable y cualitativo del individuo en su desarrollo de sus competencias de la enseñanza instaurada en su capacidad de desarrollarse en variadas áreas del conocimiento (Anaya, 2021).

Conocimiento Regular. Referido al síntesis y beneficiamiento medianamente en el transcurso del aprendizaje del ser humano (Anaya, 2021).

Conocimiento Bajo. Referido al avance tope para el beneficio y para la comprensión del conocimiento que se ha logrado vigilantemente en el transcurso de la preparación del individuo (Anaya, 2021).

2.2.2 Actitudes

Se define la actitud como una "construcción hipotética", es decir, un proceso o sustancia que asumimos que hay, aunque no se pueda observar directamente. Generalmente, en la psicología, una actitud se define como una tendencia o

capacidad para poder responder a determinados estímulos o para comportarse de una forma predeterminada (Moreno et al., 2021).

En resumen, por un lado, las actitudes se condensan e integran muchos componentes entre las cuales destacan las creencias, emociones, roles, patrones de comportamiento, etc. y a su vez se entrelazan entre sí para formar un sistema de caracteres que se comunican entre sí, según el propósito del sujeto y dirección del significado (Moreno et al, 2021).

Componente de las actitudes:

Una actitud es un proceso o estado mental interno que se manifiesta en las reacciones o patrones de expresiones que son observables; de manera similar, una actitud se caracteriza por sus propiedades evaluativas internas y su concepto multidimensional lo define en términos de sus tres componentes o tipos de respuestas.

componente afectivo; referido a los estados de ánimo, sentimientos y emociones que nos provoca el objeto o la entidad de la conducta.

componente cognitivo; referida al entendimiento, ideas, dogmatismos y conocimientos que nos provoca el objeto o la entidad de la actitud.

componente conductual; referida a las acciones que nos provoca el objeto o la entidad de la actitud.

2.2.3 Anticoncepción oral de emergencia

2.2.3.1 Definición:

Para (Stein y otros, 2022) definen a los anticonceptivos de emergencia como los medicamentos y medios que son utilizados para evitar los embarazos no planificados, después de haberse consumado el acto sexual en donde no se usó ningún método de protección para evitar las concepciones no previstas. También se define a los anticonceptivos de emergencia como un método simple, confiable y eficaz destinado al sistema de programa familiar para reducir y controlar los embarazos no planificados en las mujeres fértiles (Acevedo et al, 2019).

Dentro de la lista de los fármacos que son usados para los anticonceptivos oral de emergencia (AOE), la fuerte demanda que hay han convertido al

levonorgestrel y acetato de ulipristal como los métodos hormonales de uso regular entre las parejas empleados en todos los casos como una herramienta necesaria para evitar los embarazos no deseados (Velarde et al, 2021)

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos, tanto el LNG y UPA están reconocidos y aprobados legalmente ambos fármacos como anticonceptivos hormonales de emergencia. Por otro parte la OMS recomienda la dosificación de estos medicamentos para la anticoncepción de urgencia el acetato de ulipristal de 30 mg y el levonorgestrel de 1,5 mg, o bien dos dosis de 0.75 mg divididas por horas hasta después del acto sexual (Organización Mundial de la Salud, 2019). También existe otro tipo de métodos donde se usan dosis de estrógenos en combinación entre Etinilestradiol y Levonorgestrel a esta unión de ambos componentes hormonales se les llama Método Yuzpe (Vargas et al, 2021).

2.2.3.2 Indicaciones

Para la (Organización Mundial de la Salud, 2019) sugiere el manejo de los anticonceptivos de emergencia en mujeres sea usado solo en situaciones especiales después haber concluido el acto coital en general: cuando no se ha usado ningún medio de anticonceptivos, en agresiones sexuales, cuando puede haber fallado algún método anticonceptivo mal utilizado, cuando ha ocurrido la ruptura del preservativo de látex masculino, por desplazamiento o retiro temprano del preservativo masculino.

2.2.3.3 Mecanismo de acción

El mecanismo de acción en cuanto al anticonceptivo de emergencia científicamente aún no ha sido establecido de manera explícita, sin embargo, algunas investigaciones demostraron que estos medicamentos pueden causar la inhibición o retardo de la ovulación, también la AOE previene la implantación en el endometrio de acuerdo algunos estudios se mostró tener efecto a nivel endometrial para prevenir la implantación. Algunos estudios también demostraron que los AOE pueden llegar a prevenir la fertilización del ovulo e impide el recorrido del espermatozoide hacia el útero, así mismo la anticoncepción de emergencia se demostró que no interrumpe el periodo de gestación y por tanto no son medicamentos que puedan ser considerados como abortivos (Derechos, 2008).

2.2.4 Tipos de anticonceptivo oral de emergencia y dosificación

a) Levonogestrel

Este medicamento según Breuner et al., (2019) fue autorizado por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos en el año de 1999, es un anticonceptivo de emergencia muy comercializado en la actualidad su dosificación es 1.5 mg en una sola toma y también viene otra dosificación de 0.75mg en dos tomas recomendado bajo criterio médico para evitar los embarazos no planificados siempre que se tomen dentro de las 72 horas después del acto sexual, no obstante estudios respaldan que se puede también usar durante las 120 horas después del coito sexual. Por otra parte, se señala que el levonorgestrel es el anticonceptivo más utilizado por los usuarios y presenta amplia disponibilidad del producto para su adquisición ya no que se requiere de una receta médica; el levonorgestrel es una hormona sintética que tiene la capacidad de alterar el transporte tubárico de los óvulos y espermatozoides previniendo de esta manera la ovulación y su fertilización de los mismo (Mazer & Ye, 2022).

b). Método Yuzpe

Breuner et al., 2019), señala que, este método es utilizado por primera vez a partir del año 1974, pero su uso, efectividad y aceptabilidad en los usuarios se vieron opacadas por los efectos adverso que presentaron como náuseas y vómitos, pese a ello en la actualidad el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (CDA), contemplan al método del anticonceptivo orales combinados como los más seguros y eficaces para la anticoncepción de emergencia (AE). Así también se encuentran su disponibilidad en dosis de 100 µg de etinilestradiol y 0,5 mg de levonorgestrel, continuada de una segunda dosis para los usuarios, al igual que el acetato de ulipristal este tipo de anticonceptivo oral combinado es necesario para su adquisición la presentación de una receta médica (Mazer & Ye, 2022).

c). Acetato de ulipristal

Breuner et al., (2019), indica que este medicamento fue autorizado por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos contiene una dosificación de 30 mg, está destinada su uso durante las 120 horas después de las relaciones sexuales donde no haya usado ningún método de protección. también el acetato de ulipristal pertenece al grupo de los moduladores selectivo del receptor

de progesterona, los efectos que producen el principio activo cuando se administra el medicamento durante el periodo menstrual teniendo capacidad de inhibir el desarrollo de folículos y a su vez también disminuyen las concentraciones de estradiol por ende retrasa o inhibe la ovulación (Mazer & Ye, 2022).

2.2.4.1 Eficacia

Según Yeboah et al., (2022), en su investigación estima en un 75% y 99% la eficacia en cuanto a los anticonceptivos de emergencia para la reducción del índice del embarazo no deseado, siempre y cuando sea tomado dentro de las 72 horas después del acto sexual. También otro estudio comparativo arrojó la eficacia entre el levonorgestrel de 85% y el método combinado o yuzpe de 57% para la prevención de las gestaciones no planificadas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022).

Por otro lado, Chan et al., (2021) destaca la importancia de la eficacia de los anticonceptivos de emergencia sobre todo en mujeres con sobrepeso, indica la superioridad del acetato de ulipristal sobre el levonorgestrel es más eficaz en 120 horas después del acto sexual que 72 horas del LNG. También otro estudio acerca de la eficacia de la “píldoras del día siguiente” indica que la efectividad del método va reduciendo como se va retrasando el uso de la siguiente manera: en las primero 24 horas la eficacia es del 95%, de 24 a 48h 85%, y de 48 a 72 h 58% (Marin, 2019).

Por otro lado, un estudio realizado indicó que los medios de anticonceptivos oral de emergencia resultan efectivos cuando se usan dentro de las 72 horas de haber tenido relaciones sexuales, sin embargo, recalcar que mientras más temprano se empieza el tratamiento aumenta el éxito de la prevención. Dentro de las 72 horas el acetato de ulipristal estimó tener una eficacia de 98.2%, en cuanto al método yuzpe logró tener una efectividad para la prevención del embarazo de 97-98% de eficacia y el régimen con levonorgestrel tuvo un promedio de 85% de eficacia. Dentro de las 72 o 120 el acetato de ulipristal demostró mayor eficacia que el levonorgestrel (Dahan & Vally, 2019).

2.2.4.2 Efectos secundarios

Shen et al., (2019) considera que dentro de los efectos secundarios más importantes ocasionados por el uso de los anticonceptivos de emergencia a los siguientes síntomas: las náuseas y los vómitos, que califican como las más

comunes en los métodos que contienen estrógenos como el método régimen Yuzpe, así también la Mifepristona puede desencadenar en el usuario efectos indeseado como el retraso menstrual, mientras que el levonorgestrel puede provocar una menstruación más adelantada. También otra investigación indica que los efectos adversos más comunes para los usuarios de UPA presentaron síntomas como dolor de cabeza (18 %), náuseas (12 %) y dolor abdominal (12 %) después de las 3 horas iniciado el tratamiento; en caso de uso con levonorgestrel los usuarios presentaron sangrado menstrual intenso como efecto secundario posterior a la administración y en relación al uso del método yuzpe presentaron los siguientes efectos secundarios más comunes que ocurren durante las primeras 24 a 48 horas de usar métodos de AE son náuseas (~50%) y vómitos (~20%), que no tienen ninguna implicancia con ingesta de alimentos (Breuner et al., 2019).

Otros efectos secundarios importantes que destacar vinculadas con el manejo de la anticoncepción oral de emergencia frecuentemente son: sensación de emesis, sangrado uterino irregular, cefalea moderada, vertigo y sensibilidad en los senos, sin embargo todos los efectos adversos que desencadenan el uso de los anticonceptivos de emergencia resultaron ser inocuos por tanto no se recomienda otro tipo de medicación, a su vez la utilización regular de la AOE puede desencadenar efectos indeseables como irregularidades menstruales (Derechos, 2008).

2.2.4.3 Contraindicaciones

los anticonceptivos orales de emergencia presentan como principal y única contraindicación al embarazo en desarrollo, conforme a los Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos de los CDC donde se resuelve que al embarazo como contraindicación para el uso e inserción del método DIU-Cu. también se indica que la utilización de por años con los anticonceptivos de emergencia no presentan riesgo de teratogenicidad en el feto por el uso de levonorgestrel EC , el método Yuzpe y acetato de ulipristal ;tampoco causan interrupción de la fecundación en el útero durante el embarazo en curso, por lo tanto las PAE no son abortivas y finalmente se ha entrado en debate sobre el uso continuo de las PAE concluyendo que no existe un límite determinado, aún dentro del mismo ciclo (Breuner et al., 2019).

Así mismo Anaya,(2021) coincide en relación a las contraindicaciones sobre el uso de los anticonceptivos de emergencia que solo se impide durante el embarazo ya conocido, no obstante que durante su uso podrían producir efecto teratógenos para el embrión o feto, continuando con normalidad el proceso del embarazo; Está contraindicado en los usuarios que presenten hipersensibilidad al Levonorgestrel, su excipiente la lactosa monohidrato, insuficiencia a la lactasa, insuficiencia hepática grave todas estas personas con estas personas se les impide el uso de anticonceptivos de emergencia.

2.2.4.4 Criterio medico de elegibilidad

De acuerdo con las especificaciones dispuestas por la OMS sobre Criterios médicos de elegibilidad en relación a los niveles 1 y 4 son recomendaciones claramente definidas, pero, para los niveles 2 y 3, puede necesitar de un mayor criterio clínico, es limitado y se sugieren vigilancia el periodo de ensayo, para las niveles 1 y 2 se recomienda que el método puede utilizarse sin presentarse mayor complicaciones y los niveles 3 y 4 significan que el método esta prohibido y no debe ser usado (Organizacion Mundial de la Salud, 2016).

Con todo lo dispuesto en la documentación de la organización son mínimas las excepciones, todas las mujeres pueden optar por el uso del anticonceptivo de emergencia y otros medios de manera segura. Así también se advierte el uso correcto de los preservativos tanto masculino como femenino, para la prevención y posibles riesgos de las enfermedades de transmisión sexual o el virus de inmunodeficiencia humana ITS/VIH (Organizacion Mundial de la Salud, 2016).

2.2.5 Anticonceptivo oral de emergencia en el Perú

En nuestro país frente a una gran controversia que desencadenó sobre el uso de la “píldora del día siguiente” por parte de algunos colectivos sociales y religiosas donde indican que dicho método de anticoncepción es atentatorio contra la vida de no nacido, ante esto el Tribunal Constitucional (TC) se resolvió en dicha instancia que el Ministerio de Salud (Minsa) puedan otorgar de manera gratuita a los usuario el anticonceptivo oral de emergencia (AOE) – levonorgestrel, conocida como la píldora del día siguiente, en cualquier establecimiento de salud del estado a nivel nacional, claro que para entrega de dicho método se requiere primero de una información adecuada, precisando que solo debe ser usada en situaciones

extraordinarias, por cuanto no puede sustituir a los anticonceptivos ordinarios (Tribunal Constitucional, 2023).

También el acto resolutivo del tribunal constitucional (TC) en el fallo del expediente N° 00238-2021-PA/TC donde recomienda al estado que la implementación del programa social de planificación familiar como política pública y la distribución libre en los establecimiento de salud el anticonceptivo de emergencia; así declaro resuelto la demanda interpuesta por Violeta Gómez Hinostroza al Minsa, donde indico que estaba violando los derechos reproductivos hacia las mujeres , así también como recibir información , a la igualdad y a la no discriminación (Tribunal Constitucional, 2023).

2.2.6 Norma técnica de planificación familiar

En nuestra nación causo gran controversia la instauración e implementación de la anticoncepción oral de emergencia (AOE) puesto a un sector de parte de la población lo señalaba como un método peligroso y hasta abortivo , debate entre el estado y los colectivo provida que genero una disputa por más de 15 años, dicha estrategia los Anticonceptivos Orales (AOE) se hallan vinculado al programa social de planificación familiar y es considerado como uno de los métodos más seguros para la prevención de los embarazos ocurridos posteriores al acto coital de riesgo o sin protección algún método ; en la actualidad los AOE pertenece al programa social de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (Hurtado & ochoa, 2022).

En nuestro país por medio del Ministerio de Salud, aprobaron el 31 de agosto del 2016 la “Norma Técnica del Programa de Planificación Familiar” donde recomiendan que todo los profesionales de salud se hagan responsables para que todo los usuarios se les puedan otorgar una excelente atención que cumplan con todo los requisitos de calidad y seguridad; dicha norma alcanza a la población menores de 18 años para gocen de una buena información acerca de la técnicas en los anticonceptivos de su preferencia (Ministerio de salud, 2021).

Según Yeboah et al, (2022) mediante la norma técnica del programa de planificación familiar, se prevé brindar la protección necesaria a la mujer se con el anticonceptivo oral de emergencia cuando se le administra: Levonorgestrel 1.5

mg (en 1 tableta 1.5 mg o 2 tabletas 0.75 mg) o el método de Yuzpe (8 tabletas de 30 ug de etinilestradiol y 150ug de levonorgestrel) solo en caso excepcionales para la prevención de los embarazos no deseados cuando se usan dentro de las 72 o 120 horas después del coito sexual sin protección. Por ende, la usuaria debe recibir una atención de consejería confidencial y siempre utilizando un lenguaje sencillo antes las recomendaciones del profesional de la salud y recordarle siempre que el anticonceptivo oral de emergencia es solo de emergencia y debe evitarse su uso constante (Hurtado & Ochoa, 2022).

2.3 MARCO CONCEPTUAL

Anticonceptivo de emergencia: es un medio del programa planificación que se puede usar después del fracaso de los métodos anticonceptivos de barrera, agresión sexual y/o píldoras anticonceptivas orales olvidadas para prevenir el embarazo (Nketia et al., 2022).

Conocimiento: viene a ser el factor o condición en que el sujeto conoce algo con la confianza adquirida a través de la vivencia de los fenómenos (Oo et al., 2019)

Actitud: es la manera en que los seres humanos razonan, meditan y sienten acerca de algo, principalmente esto se demuestra en los sujetos mediante la observación de su forma de su comportamiento (Oo et al., 2019).

Mecanismo de acción: es el resultado bioquímico inicial responsable de las perturbaciones fisiológicas y/o anatomopatológicas derivadas de interacción de un tóxico con un sistema biológico (Velarde et al., 2021).

Eficacia: es la facultad que tiene un medicamento de ejercer un estímulo y que está determinada por las propiedades moleculares del ingrediente activo del medicamento.

Efectos secundarios: Es resultado indeseable causado por la ingesta de una fórmula farmacéutica cualquiera que en su principio no se esperaba cuando se recetó dicho medicamento (Velarde et al., 2021).

Levonorgestrel: es una píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) de progestágeno solo, es un posible método anticonceptivo usado por las mujeres y

solo debe usarse, para uso de emergencia dentro de los 3 días posteriores al acto coital sin ningún medio de prevención (Odwe et al, 2023).

Planificación familiar: es un proyecto que busca prevenir los embarazos no deseados; que va a permitir a las personas lograr el espaciamiento deseado entre los nacimientos y el tamaño de la familia, y contribuye a mejorar la calidad de salud de la población de familias (Sharma et al., 2020).

Embarazo adolescente: El embarazo en el transcurso de la fase en la adolescencia es un factor latente de peligro importante para los resultados adversos del embarazo (Shri et al., 2023).

Aborto terapéutico: es el procedimiento quirúrgico que se realiza a la gestante también es conocido como el aborto por motivos de salud (Maira et al., 2019).

2.4 HIPOTESIS

2.4.1 Hipótesis general

- Como el conocimiento se relaciona significativamente con la actitud sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023

2.4.2 Hipótesis específico

- Existe relación significativa entre actitud y definición sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023.

- Existe relación significativa entre la actitud con la dimensión uso sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023.

- Existe relación significativa entre la actitud con la dimensión eficacia sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023.

- Existe relación significativa entre la actitud y dimensión reacciones secundarias sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023.

III.METODOLOGIA

3.1 Tipo de investigación

Es básica, pero también es conocida como investigación pura, este tipo de investigación no aborda una pregunta directa, sino que sirve como base teórica para otros tipos de investigación (Arias & Covinos, 2021).

Es descriptiva ya que implica la explicación, registro, análisis y comentarios de fenómenos, esto también se aplica a la realidad actual, cuya característica principal es darnos una interpretación correcta (Tamayo, 2004)

Es transversal por a través de la investigación permitió la recopilación de datos para poder describir las variables con preguntas específicas para determinar la ocurrencia o interrelaciones (Villanueva, 2022)


Es correlacional porque se pudo determinar la relación o el vínculo entre los diferentes eventos, categorías o variables y el tipo de asociación determinada: positiva o negativa (Villanueva, 2022).

3.2 Enfoque y diseño

El enfoque que presento este informe de estudio tuvo un criterio cuantitativo ya que toda la información que se han obtenido es de condición numérica, así mismo todos los resultados fueron tabulados en el programa de cálculos Microsoft Excel versión 2019.

El trabajo de este proyecto presento un diseño de estudio no experimental-correlacional, porque en el estudio se determinó la correlación entre el nivel de conocimiento y las actitudes sobre de la anticoncepción oral de emergencia en los colaboradores de droguerías de Capón Center en Cercado de Lima 2023 (Villanueva, 2022).

Por tanto, el diagrama que corresponde a esta investigación es la siguiente:



Donde:

M = es la muestra

O₁ = Conocimiento

O₂ = Actitud

R = es la correlación entre dichas variables

3.3 Variables

3.3.1 Variables independientes

- Conocimiento

3.3.2 Variable dependiente

- Actitud

3.4 Población y muestra

La población en estudio estuvo constituida por 206 colaboradores de droguerías del centro comercial capón center en el distrito de Cercado de Lima

La muestra fue constituida probabilísticamente, de manera en que todos los participantes tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra, de manera que permitió la elaboración del proyecto de estudio.

La muestra tiene un nivel de confianza 95% y un margen de error del 5%. Por ende, se empleó siguiente formula:

$$n = \frac{z^2 * p * q * N}{e^2(N - 1) + z^2 * p * q}$$

Donde:

DESCRIPCION	VALOR
N= Población	208
Z= Nivel de confianza	1.96
p= Probabilidad de éxito	0.50
q= Probabilidad de fracaso	0.50
e= Error máximo	0.05
n= Tamaño de muestra	134

Reemplazando los datos en la formula:

$$n = \frac{1.96^2 * 0.50 * 0.50 * 208}{0.05^2 * (208 - 1) + 1.96^2 * 0.50 * 0.50}$$

$$n = 134.7111$$

$$n = 134$$

Según la formula la muestra está conformada por 134 colaboradores del centro comercial de capón center en el distrito de cercado de lima-2023.

Criterio de inclusión

- Participantes mayores de edad que laboran en las droguerías dentro del centro comercial de capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023.

- Participantes sexualmente activas que laboran en las droguerías dentro del centro comercial de capón center en el distrito de Cercado de Lima, 2023.

- Participantes que hayan usado anticonceptivos orales de emergencia que laboran en las droguerías dentro del centro comercial de capón center en el distrito de Cercado de Lima, 2023.

- Participantes que aceptaron voluntariamente las encuestas que laboran en las droguerías dentro del centro comercial de capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023.

Criterio de inclusión

- Participantes menores de edad que laboran en las droguerías dentro del centro comercial de capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023.

- Participantes que no son sexualmente activas que laboran en las droguerías dentro del centro comercial de capón center en el distrito de Cercado de Lima, 2023.

- Participantes que no hayan usado anticonceptivos orales de emergencia que laboran en las droguerías dentro del centro comercial de capón center en el distrito de Cercado de Lima, 2023.

- Participantes que no aceptaron voluntariamente las encuestas que laboran en las droguerías dentro del centro comercial de capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023.

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica empleada en dicho proyecto fue una encuesta, que permitió recolectar toda la información necesarios para evaluar la correlación entre el conocimiento y la actitud sobre anticonceptivo oral de emergencia en los colaboradores de la Galería de Capón Center en el distrito de Cercado de Lima.

El instrumento empleado fue un cuestionario dividido en dos, la primera para evaluar el conocimiento dividido en 4 dimensiones y la segunda para determinar la actitud dividida en 3 dimensiones

3.6 Técnica de procesamiento y análisis de datos

Después de haber obtenido toda la información de los datos de los participantes se procedió a ingresar al programa de Microsoft Excel versión 2019 para su tabulación; para después ser sometido al programa estadístico de análisis SPSS para poder contrastar las hipótesis, elaboración de las tablas y gráficos los cuales van a significar la obtención los siguientes resultados.

3.7 Criterio ético y rigor científico

Se tomaron en cuenta los siguientes principios:

- **Respeto por las personas:** bajo esta premisa se desprenden cuatro aspectos que deben efectuarse: la autorización voluntaria, el consentimiento informado, el resguardo de la privacidad y de carácter confidencial.

- **Principio de beneficencia:** en este principio no se debe de ocasionar daño y poder garantizar el bienestar de los objetos de la investigación sobre la base de una evaluación previa de los riesgos y beneficios potenciales.

-**Principio de justicia:** este principio incluye compartir los riesgos y beneficios potenciales de la investigación por igual en la sociedad, de modo que en el estudio podrá llevarse a cabo, sin perjuicio de la población desfavorecido u otras formas de elecciones inapropiadas en la selección de los participantes.

IV. RESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 Presentación de resultados

Tabla 1. Presentación de intervalo de la variable X (Conocimiento)

Dimensiones	Indicadores	N ítems	Categorías	Intervalos
Definición sobre AOE		4	Correcta Incorrecta	
Uso		3	Correcta Incorrecta	
Eficacia		2	Correcta Incorrecta	
Efectos secundarios		2	Correcta Incorrecta	
Conocimiento		11	Bajo Medio Alto	0 -3 4 -8 9-11

Tabla 2. Presentación de intervalo de la variable Y (Actitud)

Dimensiones	Indicadores	N Ítems	Categorías	Intervalos
Cognitiva		4	Desacuerdo Indeciso De acuerdo	5 -7 8 -10 11-13
Afectiva		4	Desacuerdo Indeciso De acuerdo	4 -6 7 -9 10-12
Conductual		4	Desacuerdo Indeciso De acuerdo	4 -6 7 -9 10-12
Actitud		12	Rechazo Indecisión Aceptación	12 -19 20 -27 28 -36

Escala para la correlación de Spearman

0.00 a 0.19	Muy baja correlación
0.20 a 0.39	Baja correlación
0.40 a 0.59	Moderada
0.60 a 0.79	Buena
0.80 a 1.00	Muy buena

4.1.1 Hallazgos

Tabla 3. Frecuencia sobre el nivel de conocimiento.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Bajo	31	23,1	23,1	23,1
	Medio	31	23,1	23,1	46,3
	Alto	72	53,7	53,7	100,0
	Total	134	100,0	100,0	

Nota: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023.

Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura:




Figura 1. Frecuencia sobre el nivel de conocimiento

De la figura 1, el 23,1 % obtuvo valoración baja en los colaboradores de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima, obtuvo una valoración medio, un 23,1% obtuvo una valoración baja y un 53,7% obtuvieron la valoración alta.

Tabla 4. Frecuencia sobre la estimación de la actitud.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Rechazo	32	23,9	23,9	23,9
	Indecisión	32	23,9	23,9	47,8
	Aceptación	70	52,2	52,2	100,0
	Total	134	100,0	100,0	

Nota: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023.

Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura:




Figura 2. Frecuencia sobre la estimación de la actitud

De la figura 2, el 23,88% de los colaboradores de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima, manifiestan que están indecisos en la variable de actitud, un 23,88% lo rechazan y un 52,24% lo aceptan.

Tabla 5. Frecuencia sobre la dimensión Cognitiva

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Desacuerdo	31	23,1	23,1	23,1
	Indeciso	71	53,0	53,0	76,1
	De acuerdo	32	23,9	23,9	100,0
	Total	134	100,0	100,0	

Nota: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023.

Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura:




Figura 3. Frecuencia sobre la dimensión Cognitiva

De la figura 3, un 52,99% de los colaboradores de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima, manifiestan que están indeciso en la dimensión cognitiva, un 23,13% están desacuerdo y un 23,88% de acuerdo.

Tabla 6. Frecuencia sobre la dimensión Afectiva

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Desacuerdo	20	14,9	14,9	14,9
	Indeciso	52	38,8	38,8	53,7
	De acuerdo	62	46,3	46,3	100,0
	Total	134	100,0	100,0	

Nota: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023.

Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura:




Figura 4. Frecuencia sobre la dimensión Afectiva

De la figura 4, el 38,81% de colaboradores de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima, manifiestan que están indeciso en la dimensión afectiva, un 14,93% están desacuerdo y un 46,27% de acuerdo.

Tabla 7. Frecuencia sobre la dimensión Conductual

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Desacuerdo	22	16,4	16,4	16,4
	Indeciso	49	36,6	36,6	53,0
	De acuerdo	63	47,0	47,0	100,0
	Total	134	100,0	100,0	

Nota: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023.

Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura:




Figura 5. Frecuencia sobre la dimensión Conductual

De la figura 5, un 36,57% de los colaboradores de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima, manifiestan que están indeciso en la dimensión conductual, un 16,42% están desacuerdo y un 47,01% de acuerdo.

4.2 Prueba de hipótesis

4.2.1 hipótesis General

Hipótesis Alternativa: El conocimiento se relacionan significativamente con la actitud sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023.

Hipótesis nula: El conocimiento no se relacionan significativamente con la actitud sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023.

Tabla 8. Correlación entre el conocimiento y la actitud sobre anticonceptivos

		El conocimiento		la actitud	
Rho de Spearman	El conocimiento	Coefficiente de correlación	1,000	,027**	
		Sig. (bilateral)	.	,754	
		N	134	134	
	La actitud	Coefficiente de correlación	,027**	1,000	
		Sig. (bilateral)	,754	.	
		N	134	134	

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Como se puede apreciar en la tabla 8 presenta un coeficiente de correlación de $r = 0,027$ con una $p = 0,754$ ($p > 0,05$) de manera que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. De modo que, se logra probar estadísticamente que no existe una relación significativamente entre el conocimiento y la actitud de los colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023. Así mismo se puede visualizar que el coeficiente de correlación es de una magnitud **muy baja**.

4.2.2 Hipótesis Especifica 1

Hipótesis Alternativa: La actitud se relaciona significativamente con la definición sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023.

Hipótesis nula: La actitud no se relaciona significativamente con la definición sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023.

Tabla 9. Correlación entre la actitud y la definición sobre anticonceptivos

			Definición sobre AOE	Actitud
Rho de Spearman	Definición sobre AOE	Coeficiente de correlación	1,000	-0,011 **
		Sig. (bilateral)	.	,0.896
		N	134	134
	Actitud	Coeficiente de correlación	-0,011 **	1,000
		Sig. (bilateral)	,0.896	.
		N	134	134

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Como se puede apreciar en la tabla 9 presenta un coeficiente de correlación de $r = -0,011$ con una $p = 0.896$ ($p > 0.05$) de manera que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. De modo que, se logra probar estadísticamente que no hay una relación significativamente entre la actitud y la definición sobre la AOE de los colaboradores en droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023. Así mismo se puede visualizar que el coeficiente de correlación es de una magnitud **muy baja**.

4.2.3 Hipótesis Especifica 2

Hipótesis Alternativa: La actitud se relacionan significativamente con el uso sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023.

Hipótesis nula: La actitud no se relacionan significativamente con el uso sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023.

Tabla 10. Correlación entre la actitud y el uso del anticonceptivo.

			Uso AOE	La actitud
Rho de Spearman	Uso AOE	Coefficiente de correlación	1,000	,094**
		Sig. (bilateral)	.	,281
		N	134	134
	La actitud	Coefficiente de correlación	,094**	1,000
		Sig. (bilateral)	,281	.
		N	134	134

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Como se puede apreciar en la tabla 10 presenta un coeficiente de correlación de $r = 0,094$ con una $p = 0,281$ ($p > 0,05$) de manera que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. En consecuencia, se logra probar que estadísticamente que no hay una relación significativamente entre la actitud y el uso AOE en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023. Así mismo se logra visualizar que el coeficiente de correlación es de una magnitud **muy baja**.

4.2.4 Hipótesis Especifica 3

Hipótesis Alternativa: La actitud se relacionan significativamente con las eficacias sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023.

Hipótesis nula: La actitud se relacionan significativamente con las eficacias sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023.

Tabla 11. Correlación entre la actitud y la eficiencia sobre anticonceptivos.

			Eficiencia	La actitud
Rho de Spearman	Eficiencia	Coefficiente de correlación	1,000	,057**
		Sig. (bilateral)	.	,510
		N	134	134
	La actitud	Coefficiente de correlación	,057**	1,000
		Sig. (bilateral)	,510	.
		N	134	134

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Como se puede apreciar en la tabla 11 presento un coeficiente de correlación de $r = 0,057$ con una $p = 0,510$ ($p > 0,05$) de manera que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. En consecuencia, se logra probar que estadísticamente que no hay una relación significativamente entre la actitud y la eficiencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023. Así mismo se logra visualizar que el coeficiente de correlación es de una magnitud **muy baja**.

4.2.5 Hipótesis Especifica 4

Hipótesis Alternativa: la actitud se relaciona significativamente con los efectos secundarios sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023.

Hipótesis nula: la actitud no se relaciona significativamente con los efectos secundarios sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023.

Tabla 12. Correlación entre la actitud y los efectos secundarios

			Efectos secundarios	La actitud
Rho de Spearman	Efectos secundarios	Coefficiente de correlación	1,000	,043**
		Sig. (bilateral)	.	,621
		N	134	134
	La actitud	Coefficiente de correlación	,043**	1,000
		Sig. (bilateral)	,621	.
		N	134	134

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Como se puede apreciar en la tabla 12 presento un coeficiente de correlación de $r = 0,043$ con una $p = 0,621$ ($p > 0,05$) de tal forma que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. De manera que, se logra probar que estadísticamente no hay una relación significativamente entre la actitud y los efectos secundarios de los colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023. Así mismo se puede observar que el coeficiente de correlación es de una magnitud **muy baja**.

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Teniendo en cuenta que los anticonceptivos orales de emergencia son los métodos más utilizados por las usuarias para la prevención del embarazo no planificado. Dentro del establecimiento de las droguerías de capón center su comercialización ha tenido una fuerte demanda por parte personas que demanda para su posterior dispensación. Así mismo la escasa información y conocimiento hacia los anticonceptivos en los colaboradores sobre las eficacia, reacciones secundarias y uso del producto en general lo convierten en un potencial peligro para las personas que adquieren el producto en mención. Por otro lado, se insta al personal Quimico-Farmaceutico brindar medio de información para su adecuada y correcta dispensación por parte del personal de colaboradores para su optima servicio en los establecimientos de droguerías.

De los resultados obtenido en el presente estudios, se halló que el 53.7% de los colaboradores de las droguerías de la galería capón center del distrito de cercado de Lima, presentan un conocimiento alto sobre anticonceptivos oral de emergencia, un 23.1% tiene conocimiento medio y un 23.1% presentan conocimiento bajo. Estos resultados difieren totalmente del estudio realizado por Carhuaz, (2023), encontro en su estudio que el 56% de los estudiantes de las estudiantes de Medicina Humana presentaron un nivel de conocimiento alto sobre anticoncepción oral de emergencia, el 27%, un nivel de conocimiento medio y el 16% un nivel de conocimiento bajo. Así mismo Huacachi (2021), en su investigación de un total del 100% (129) de egresados de medicina no presenta un resultado opuesto a resultados hallados por parte del investigador en relación al nivel de conocimiento, obtuvo que solo un 17,1% de sus encuestados presentaron un nivel alto de conocimiento, 51,9% tenían un nivel medio de conocimientos y 31,0 % tenían un nivel bajo de conocimientos. Por otro lado, Romero (2022) en su estudio según los datos de sus resultados obtenidos en el nivel de conocimiento evidenciaron que el 49,82% de los muestreados tienen un nivel bajo de conocimiento, seguido de un 33,33% que se ubica en el nivel medio y por último se obtuvo un 16,85% que representa al nivel alto de conocimiento acerca del AOE, resultados que acercan a las del investigador. También Taza (2022), en su investigación logra obtener resultados cuanto al nivel de conocimiento sobre la “anticoncepción oral de emergencia”, en su mayoría fue medio (75%); donde el

conocimiento general fue bajo (49,3%) y medio (48,6%), y también obtiene otros resultados que, si bien no forma parte manera general, pero que está bien poder mencionar; halló el conocimiento de forma de uso fue medio (56,9%) y el conocimiento de modo de acción fue bajo (68,1%). De igual manera en su estudio Quispe Castro & Quispe Gamboa, (2021) referido al nivel de cognición sobre la anticoncepción oral de emergencia la muestra se observa que el 57% de estudiantes tienen conocimientos malos, el 33% conocimientos regulares y el 10% conocimientos buenos respectivamente; resultados casi similares a la del investigador. Por otra parte, Machari & Medina (2019), en su investigación en su muestra representativa donde estuvo conformada por 153 participantes obtuvieron los siguientes resultados que difieren totalmente al del investigador halló que el 61(40%) tienen nivel de conocimiento deficiente, 55(36%) nivel de conocimiento muy bueno, 25(16%) nivel de conocimiento regular. También en su estudio Valdivia (2019) en su estudio sobre conocimiento sobre el uso de la píldora de emergencia en jóvenes que asistieron a una discoteca, los resultados obtenidos fueron los siguientes, el 43% de jóvenes tuvieron conocimiento medio, el 32% de jóvenes tuvieron conocimiento alto y el 25% de jóvenes tuvieron conocimiento bajo.

En relación a las actitudes Tapia (2019), en su investigación obtenida en cuanto la variable actitudes en los muestreados se halló que un 72 de los participantes, que representan un 44,72 % del total de los participantes encuestados obtuvieron en promedio al cuestionario de actitudes entre 20 y 60, lo cual corresponde la categoría de actitud Positiva sobre el uso de la píldora del día siguiente. Así mismo de 89 de los participantes, que representan en promedio al 55,28 % del total de encuestados obtuvieron un puntaje al cuestionario de actitudes entre 61 y 100, lo cual corresponde la categoría de una actitud Negativa frente a la misma. Por otro lado, Gomez & Llallico (2022) en su investigación obtiene datos referentes a las actitudes, se determinó que del 100% (110), más de la mitad presentaban actitudes regulares [51.8% (57)], en tanto un 25.5% presentaban buenas actitudes y un 22.7% (25) actitudes deficientes. También en su investigación Perera & Abeysena (2019), obtiene resultados de su muestra alrededor de un tercio (30,5%, n=477) de los estudiantes universitarios tenían una actitud satisfactoria hacia la anticoncepción, mientras que el 69,5% (n=1089) de los estudiantes universitarios tenían una actitud desfavorable hacia la anticoncepción. Resultados

que difieren totalmente a los hallados por parte del investigador. Así mismo Maurice et al (2022) en su investigación en relación a la evaluación de actitud de la CE mostró entre los encuestados el 81% tenían una actitud positiva hacia la anticoncepción de emergencia. De los 293 encuestados que alguna vez habían tenido relaciones sexuales 148 (50,5%) informaron uso de CE durante el coito. Por otra parte, Osei-Tutu, (2019) en su investigación sobre la teoría del conocimiento, la actitud y la práctica, este artículo investiga el conocimiento y la actitud de los hombres hacia los anticonceptivos de emergencia, sus resultados entre las muestras presentaron que tenían una actitud favorable y otros desfavorable hacia los anticonceptivos de emergencia, la mayoría de ellos (82%) tenían una actitud mixta hacia los anticonceptivos de emergencia. Los resultados difieren totalmente al del investigador, tenían significativamente más probabilidades de tener una actitud favorable que desfavorable hacia los anticonceptivos de emergencia. Otros resultados como la de Shamsu-Deen y otros (2021) en su estudio muestra que la actitud general de los participantes hacia el uso de AE se evaluó mediante respuestas de actitud individuales donde finalmente, se consideró que los participantes con una puntuación media de 1,5 y superior tenían una actitud positiva hacia la CE, mientras que aquellos con una puntuación inferior a 1,5 (promedio) se clasificaron como de mala actitud hacia la CE. En tal sentido los resultados obtenidos representan que, 54,0% de los encuestados tiene una actitud positiva hacia la CE. En cambio, el 46,0% tenía una mala actitud hacia la CE. También en esa misma línea Salazar (2019) en su investigación en relación a la investigación observaron que la actitud hacia la AOE entre sus muestreados obtiene como total de indiferencia 62%, rechazo 20% y de aceptación 18%. También en su investigación. Alvarado (2022), obtiene que el 78% en los encuestados poseen conocimiento en el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia, por otro lado, el 22% desconoce sobre la píldora anticonceptiva de emergencia, en consecuencia, hay un 75% de los encuestados tienen una actitud aceptable en el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia ya que el 21 % tiene actitud indiferente y el 4.2% muestra rechazo sobre el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia. Resultados casi similares a las del propio investigador con respecto a la actitud de indiferencia. De acuerdo con las

dimensiones planteadas se halló que la mayor parte de los participantes evidenciaron tener una actitud indiferente en las tres dimensiones; cognitiva 78%, afectiva 72% y conductual 65%. Por otra parte, se halló menos porcentajes en el nivel aceptación registrándose en promedio para: cognitiva 17%, afectiva 15% y conductual 13% y de rechazo: cognitiva 5%, afectiva 13% y conductual 22%. Por otro lado, Pezo (2019), en su investigación entre sus participantes obtuvo que el 89,2% (n=74) presentaron una actitud de indiferencia, un 9,6% (n=8) los encuestados manifestaron tener una actitud desfavorable y un 1,2% (n=1) en relación a las personas sometidas a las encuestas manifestaron tener una actitud favorable en consecuencia, del total de las muestras evaluadas. En el componente de la actitud cognitiva el 63,9% (n=53) evidenciaron tener una actitud indiferente, un 33,7% (n=28) de los participantes presentaron una actitud desfavorable y un 2,4% (n=2) en los encuestados manifestaron tener actitud favorable. En el componente de la actitud afectiva el 74,7% (n=62) se logra evidenciar que los participantes tienen una actitud de indiferencia, el 19,3% (n=16) de los encuestados presentan una actitud desfavorable y por otro lado un 6% (n=5) presentaron tener actitud favorable. En la dimensión actitud conductual el 79,5% (n=66) resultaron tener una actitud indiferente, un 18,1% (n=15) arrojaron tener una actitud desfavorable y un 2,4% (n=2) mostraron actitud favorable en los participantes.

VI. CONCLUSIONES

- En cuanto al objetivo general del proyecto de investigación, de acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que un 53% de los participantes tiene un conocimiento alto y presentan un 70% presenta una actitud de aceptabilidad al método de los anticonceptivos oral de emergencia. Por otro lado, no se halló conocer ninguna relación de significancia entre el conocimiento y la actitud sobre anticonceptivos oral de emergencia en los colaboradores de las droguerías de capón center en el distrito de Cercado de lima.

En relación a los objetivos específicos:

- De esta manera al objetivo expuesto en la investigación se concluye; no se logró conocer ninguna relación de significancia entre la variable actitud y la dimensión definición general sobre anticonceptivos oral de emergencia en los colaboradores de las droguerías de capón center en el Distrito de Cercado de Lima

- De acuerdo al objetivo elaborado en la investigación se concluye; no se conoció ninguna relación de significante entre la variable actitud y la dimensión uso sobre anticonceptivos oral de emergencia en los colaboradores de las droguerías de capón center en el distrito de Cercado de Lima

- De acuerdo con los resultados obtenidos se determinó que; no hallo conocer ninguna relación significativa entre la variable actitud y la dimensión eficacia sobre anticonceptivos oral de emergencia en los colaboradores de las droguerías de capón center en el Distrito de Cercado de Lima.

- Se concluye que no hallo conocer ninguna relación de significancia entre la variable actitud y la dimensión efectos secundaria sobre anticonceptivos oral de emergencia en los colaboradores de las droguerías de capón center en el distrito de Cercado de lima.

VII. RECOMENDACIONES

- Se recomienda orientar a los colaboradores de Droguerías de Capón Center en Cercado de Lima-2023 sobre la utilización correcta y responsable de la anticoncepción oral, debe ser previa una prescripción y supervisado por el Químico Farmacéutico.

- Mantener información constante a los colaboradores de Droguerías de Capón Center en Cercado de Lima-2023 que se automedican con anticoncepción oral, sobre la importancia del uso adecuado y las consecuencias que puede ocasionar si no cumplen estrictamente el tratamiento y sus indicaciones.

- Se recomienda a los colaboradores de Droguerías de Capón Center en Cercado de Lima-2023 de acuerdo a los procedimientos y mandatos establecidas por el Ministerio de Salud a cumplir sobre el uso racional de la anticoncepción oral.

- Al Ministerio de Salud, enfatizar en el cumplimiento de las normativas instituidas sobre el uso racional de anticoncepción oral con la finalidad de minimizar los riesgos en la salud pública.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). *Colombia potencia de vida, Anticoncepcion de emergencia*.
<https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Anticoncepcion-de-emergencia.aspx>
- Abarzúa, C., Pezzola, C., Romero, N., Venegas, S., Boettcher, B., Quijada, J., Flores, D., Rodríguez, M., & González, A. (2021). Emergency contraception knowledge in female adolescent secondary education students from Hualqui commune, Chile. *Revista chilena de obstetricia y ginecologia*, 86(1), 52-60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262021000100052>
- Acevedo, G., Ramirez, N., Cardona, J., & Oliveros, c. (2019). Awareness and use of emergency contraception methods among university students in Pereira, Colombia. *Universidad y Salud*, 21(2), 159-165.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22267/rus.192102.150>.
- Aguilar Diaz, M., & Huaccachi Montes, M. (2020). Relación entre el nivel de conocimiento y actitudes hacia el anticonceptivo oral de emergencia en mujeres que asisten al centro materno infantil “San Genaro - Chorrillos, 2019. [Tesis de licenciatura, Universidad Arzobispo Loayza]
<http://190.116.43.195/bitstream/handle/UAL/244/T%20OBS%200114%20AGUILAR%20DIAZ%20Y%20HUACACHI%20MONTES.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Al Metwali, B., & Shaukat, J. (2022). Knowledge, Attitude, and Practices of Iraqi Community Pharmacists Toward Emergency Contraceptives . *Iraqi Journal of Pharmaceutical Sciences*, 31(suppl), 141-1532.
<https://doi.org/10.31351/vol31issSupl.pp141-152>
- Alharbi, M. S., Almujiil, A. S., Alreshid, F. F., & Kutbi, E. H. (2019). Knowledge and attitude about emergency contraception among Saudi women of

childbearing age. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 8(1), 44-48.
https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_292_18

alvarado, R. (2022). *Conocimientos y actitudes del uso de la píldora anticonceptiva de emergencia en estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz – 2022*[tesis de pregrado, Universidad Santiago Antunez de Mayolo]. Repositorio institucional.
<http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/5091>

Alvarado, S. (2022). Conocimiento y Actitud sobre Anticoncepción Oral de Emergencia en los estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de Cajamarca filial Jaén, 2020. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Cajamarca].
<https://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14074/5008/Tesis%200-%20Conocimientos%20y%20actitud%20sobre%20anticoncepci%C3%B3n%20oral%20de%20emergencia%20-%20Alvarado%20S%C3%A1nchez%20Sandra%20Beatr%C3%ADz%20%281%29.pdf?sequence=1>

Anaya, M. (2021). Conocimientos y actitudes sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia en estudiantes de primero a quinto grado de secundaria de la institución educativa privada Virgen de la Candelaria, San Juan de Lurigancho, 2020. [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Federico Villarreal]. <https://hdl.handle.net/20.500.13084/4642>

Arias, J., & Covinos, M. (2021). *Diseño y Metodología de la Investigación* (1 ed.). Editorial Enfoques consulting EIRL.
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Arias-Covinos-Dise%C3%B1o_y_metodologia_de_la_investigacion.pdf

Báldarrago, B. (2021). *Nivel de conocimiento y actitud sobre el manejo de la píldora del día siguiente en adolescentes que acuden a las oficinas farmacéuticas del distrito de Carabayllo, año 2021*. [Tesis de pregrado, Universidad Roosevelt]:
<https://repositorio.uoosevelt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14140/575/Te>

sis%20Berbeli%20Yaqueline%20B%c3%a1ldarrago%20Santos.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Breuner, C., Alderman, E., Grubb, L., Hornberger, L., Powers, M., Upadhy, K., & Wallace, S. (2019). Emergency Contraception. *Pediatrics*, *144*(6), 31-49. <https://doi.org/10.1542/peds.2019-3149>
- Carhuaz, I. (2023). Nivel de conocimiento y actitudes sobre anticoncepción oral de emergencia en las estudiantes de Medicina del 1ro al 3er año de Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión-Pasco- 2022 [tesis de pregrado, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion]. Repositorio institucional. <http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2962>
- Castro, J., Rodrigues, V., & Almeida, C. (2019). Young people's attitude towards emergency oral contraception: translation and validation of a scale. *Journal Motricidade*, *15*(4), 46-50. <https://doi.org/https://doi.org/10.6063/motricidade.20150>
- Chan, M., Munro, S., Schummers, L., Albert, A., Mackenzie, F., Soon, J., Ragsdale, P., Fitzsimmons, B., & Renner, R. (2021). Dispensing and practice use patterns, facilitators and barriers for uptake of ulipristal acetate emergency contraception in British Columbia: a mixed-methods study. *cmaj open*, *9*(4), 1097-1104. <https://doi.org/https://doi.org/10.9778/cmajo.20200193>
- Chapa-Romero, J., Guevara-Ríos, E., Gutiérrez-Ramos, M., Pérez-Aliaga, C., & Ayala-Peralta, F. D. (2019). Implicancias legales de la sentencia judicial en anticoncepción oral de emergencia. *Revista Peruana De Investigación Materno Perinatal*, *8*(3), 40-44. <https://doi.org/https://doi.org/10.33421/inmp.2019164>
- Dahan, N., & Vally, M. (2019). The use of emergency hormonal contraception in South Africa: current and future perspectives. The use of emergency hormonal contraception in South Africa: current and future perspectives,. *South African Family Practice*, *61*(2), 46-48. <https://www.ajol.info/index.php/safp/article/view/234377>

- Davis, P., Sarasveni, M., Krishnan, J., Diwakara, L., & Kumar, N. (2020). Knowledge and attitudes about the use of emergency contraception among college students in Tamil Nadu, India. *Journal of the Egyptian Public Health Association*, 95(1), 2-11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s42506-019-0030-9>
- De Hoyos Benites, S. (2020). El método científico y la filosofía como herramientas para generar conocimiento. *Revista Filosofía UIS*, 19(1), 229-245. <https://doi.org/https://doi.org/10.18273/revfil.v19n1-2020010>
- Del Rosario, T. (2019). Conocimientos, actitudes y prácticas frente al uso de la anticoncepción oral de emergencia en estudiantes de la carrera profesional de Técnico en Enfermería del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Santa Rosa–Ventanilla, setiembre 2019. [tesis de pregrado, *Universidad Privada del Norte*]. <https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/23366>
- Derechos, I. I. (2008). *Instituto Interamericano de Derechos Humanos*. Editorama. <https://doi.org/https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Libro%203.%20Anticoncepcion%20oral.pdf>
- Fermin Meza, S., & Vásquez Tongo, E. (2019). Conocimiento y actitudes de la anticoncepción oral de emergencia en estudiantes de obstetricia de la Universidad Privada del Norte 2019. [Tesis de Licenciatura, *Universidad Privada del Norte*]. <https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/23877/Fermin%20Meza%2c%20Sandy%20Yarira%20%20-%20V%c3%a1squez%20Tongo%2c%20%20Ethylin%20de%20Lourdes%200.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Gomez, C., & Llallico, Y. (2022). *Nivel de conocimiento y actitudes que tienen las puérperas sobre métodos anticonceptivos en el Centro de Salud las Moras, Huánuco 2020* [tesis de pregrado, *Universidad Nacional Hemilio Valdizan*]. Repositorio Institucional. <https://hdl.handle.net/20.500.13080/7975>
- Guillen, B. (2019). Conocimiento y actitud sobre el uso del anticonceptivo oral de emergencia en adolescentes de la Institución Educativa 0027- Jicamarca -

2019. [Tesis de licenciamiento, Universidad Cesar Vallejo].
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/40608/GUILL EN_PB.pdf?sequence=1
- Hashem, s., El-Gamal, S., Elbohoty, S., & El-Nagar, A. (2022). Effect of Educational Instructional Module on Childbearing Women's Awareness Regarding Emergency Contraception. *Tanta Scientific Nursing Journal*, 26(3), 242-263. <https://doi.org/10.21608/TSNJ.2022.255792>
- Huacachi, C. (2021). *Nivel de conocimientos y actitudes sobre anticoncepción oral de emergencia en egresados de medicina , de la Universidad San Juan Bautista, 2021*[tesis de pregrado, Universidad Privada San Juan Bautista]. Repositorio institucional. <https://hdl.handle.net/20.500.14308/3305>
- huayhuarina, J. (2019). Nivel de conocimiento y Actitudes sobre anticonceptivo oral de emergencia en usuarias del centro de salud La Libertad, Huancayo, 2021. [Tesis de pregrado, Universidad Roosevelt].
https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14140/717/Tesis_Jhanet.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Hurtado, F. (2020). Methodological Foundations of Research: The Genesis of New Knowledge. *Revista Scientific*, 5(16), 99-119.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2020.5.16.5.99-119>
- Hurtado, G., & ochoa, E. (2022).). Nivel de conocimiento en el uso del anticonceptivo oral de emergencia en mujeres de 18 a 40 años que acuden a la Botica Killafarma del distrito de los olivos en el periodo Enero-febrero,2022. [tesis de pregrado, Universidad Interamericano para el desarrollo].
http://repositorio.unid.edu.pe/bitstream/handle/unid/262/T117_73366622_T%20T117_80625387_T.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Karim, S., Irfan, F., Saad, H., Alqhtani, M., Alsharhan, A., Alzhrani,, A., Alhawas, F., Alataui, S., Alassiri, M., & Ahmed MA, a. (2021). Men's knowledge, attitude, and barriers towards emergency contraception: A facility based cross-

- sectional study at King Saud University Medical City. *Plos One*, 16(4), 249-292. <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249292>
- Kwame, K., Bain, L., Tarkang, E., & Manu, E. (2022). Use and awareness of emergency contraceptives among women of reproductive age in sub-Saharan Africa: a scoping review. *Contraception and Reproductive Medicine*, 7(1), 2-14. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s40834-022-00167-y>
- Leelakanok, N. P. (2022). A systematic review and meta-analysis of attitude and knowledge involving emergency oral contraceptive use in patients and healthcare providers. *International Journal of Clinical Pharmacy*, 44, 873-893. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11096-022-01445-0>
- Leon, F., Ruiz, C., Jalon, R., & Praena, J. (2022). Nursing Students' Knowledge, Awareness, and Experiences of Emergency Contraception Pills' Use. *Journal of Clinical Medicine*, 11(2), 418. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jcm11020418>
- Machari, P., & Medina, K. (2019). *Nivel de conocimiento y actitud del método anticonceptivo oral de emergencia en adolescentes de una Institución Educativa Chanchamayo-2018*[tesis de pregrado, Universidad Peruna Los Andes]. Repositorio Institucional. <https://hdl.handle.net/20.500.12848/1420>
- Maira, G., Casas, L., & Vivaldi, L. (2019). Abortion in Chile. *Health Hum Rights Journal*, 21(2), 121-131. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6927382/>
- Marin, a. (2019). La anticoncepción hormonal de emergencia: Mitos y Realidades. *Revista Ciencia Y Salud Integrando Conocimientos*, 3(6), 2-5. <https://doi.org/https://doi.org/10.34192/cienciaysalud.v3i6.99>
- Maurice, N., Olivier, M., Jean-Claude , A., Théophile , B., Zacharie , K., & Stanis , O. (2022). knowledge, attitude and utilization of emergency contraceptive in Idjwi Island in the Democratic Republic of the Congo. *International Journal of Family & Community Medicine*, 6(4), 145-151. <https://doi.org/10.15406/ijfcm.2022.06.00280>

- Mazer, M., & Ye, P. (2022). Emergency contraception in the emergency department. *The American Journal of Emergency Medicine*, 63(2), 102-105. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ajem.2022.10.034>
- Mesfin, D. (2020). Emergency contraceptive knowledge, utilization and associated factors among secondary school students in Wolkite town, southern Ethiopia, cross sectional study . *Contraception and Reproductive Medicine*, 5(15), 1-10. <https://doi.org/> <https://doi.org/10.1186/s40834-020-00119-4>
- Ministerio de salud. (7 de Julio de 2019). *Minsa brindará información y distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia*. <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/45451-minsa-brindara-informacion-y-distribucion-gratuita-del-anticonceptivo-oral-de-emergencia>
- Ministerio de salud. (2021). Norma técnica de salud de planificación familiar. <https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/2179344-norma-tecnica-de-salud-de-planificacion-familiar>
- Miranda Huamani, W., Melgarejo Escobar, J., Mendoza Gutiérrez, L., Miranda Velásquez, T., & Naucapoma Manrique, T. (2022). Conocimientos, prácticas y actitudes sobre el anticonceptivo oral de emergencia en las estudiantes de pregrado de la Facultad de Medicina de la UNMSM, 2021. *Revista Internacional de Salud Materno Fetal*, 7(1), 8-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.47784/rismf.2022.7.1.266>
- Mishore, K., Woldemariam, A., & Huluka, S. (2019). Emergency Contraceptives: Knowledge and Practice towards Its Use among Ethiopian Female College Graduating Students. *International Journal of Reproductive Medicine*, 2019(15), 1-8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2019/9397876>
- Moreno, J. E., Pereyra, M., & Rodríguez, L. (2021). Manual del Cuestionario de Actitudes ante Situaciones de Agravio (CASA). *Serie Cuadernos de Psicología y Psicopedagogía*. <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/11362>
- Nketia, R., Atta, D., Adobasom, A., Shaibu, U., Naana , F., & Nketiah, Y. (2022). Knowledge, Attitude, Utilization And Barriers to Emergency Contraception

among Reproductive-Age Women Between 15 and 24 Years in Ghana's Poor and Low-Resource Settings: The Case of East-Gonja Municipality. *International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Research*, 10(1), 1392–1396.

<https://doi.org/https://doi.org/10.53075/ljmsirq/68743045656>

Odwe, G., McCann, B., Liambila, W., Vandermark, J., Mwanga, D., Anab, E., Wanami, M., & Ramarao, S. (2023). Feasibility of e-commerce pharmacy provision and acceptability of levonorgestrel 1.5 mg for pericoital use in urban and peri-urban settings in Kenya: a prospective cohort study. *BMJ Sexual and Reproductive Health*, 49(1), 35-42.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1136/bmjshr-2022-201653>

Oo, M., Ismail, N., Ean, W., Hamid, H., & Affendi, N. (2019). Knowledge, Attitude and Perception of Contraception among medical Students in Universiti Putra Malaysia. *Malaysian Journal of Public Health Medicine*, 19(2), 11-19.

<https://doi.org/https://doi.org/10.3<7268/mjphm/vol.19/no.2/art.165>

Organizacion Mundial de la Salud. (2016). *Rueda con los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos*.

<https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241549257>

Organizacion Mundial de la Salud. (9 de noviembre de 2019). *Anticoncepción de urgencia*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/emergency-contraception>

Osei-Tutu. (2019). Male Undergraduate Students' Knowledge of and Attitude Towards Emergency Contraceptives. *African Sociological Review*, 23(2), 125-146. <https://www.jstor.org/estable/26868087>

Parales, C. (2020). *Psicología social un acercamiento histórico al estudio de las relaciones sociales* (1ra ed.). (G. Books, Ed.)

https://www.google.com.pe/books/edition/Psicolog%C3%ADa_social/KvXPDwAAQBAJ?hl=es-419&gbpv=1&dq=psicologia+y+manejo+de+las+actitudes&pg=PT143&printsec=frontcover

- Perera, U., & Abeysena, C. (2019). Knowledge and attitudes towards contraceptives among undergraduates in the state universities of Western Province. *Journal of the College of Community Physicians of Sri Lanka*, 25(2), 73-79. <https://doi.org/https://doi.org/10.4038/jccpsl.v25i2.8180>
- Pezo, C. (2019). *Actitudes frente al uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa "Francisco Bolognesi" Villa El Salvador-2018* [Tesis de posgrado, Universidad Cesar Vallejo]. Repositorio institucional. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/30643>
- Pfutory Vilchez, K. (2022). Conocimiento, Actitudes y Prácticas Sobre Anticoncepción Oral de Emergencia en mujeres de edad reproductiva en el contexto COVID-19. Botica JK FARMA. [Tesis de pregrado, Universidad de San Martín de Porres]. https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/10783/Pfutory_VKR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Quintero, P., & Zamora, O. (2020). Tipos de Conocimiento. *Open Journal Systems*, 2(4), 23-24. <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa1/article/view/5124>
- Quispe Castro, M., & Quispe Gamboa, M. (2021). *Conocimiento y actitud frente a la anticoncepción oral de emergencia, en estudiantes de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga octubre 2019 - setiembre 2020*. [tesis de pregrado, Universidad San Cristobal de huamanga]. Repositorio Institucional. <http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4046>
- Rodrigues, Á., Valentin, B., Tavares, D., Augusto, M., Campelo, J., Loureiro, M., Raposo, A., Alves, I., Almeida, M., & Santos, I. (2022). Knowledge and Patterns of Use of Emergency Oral Contraception among Portuguese Female Users of Healthcare Services. *AMP Acta Médica Portuguesa*, 35(1), 30-35. <https://doi.org/https://doi.org/10.20344/amp.14043>
- Romero, L. (2022). *Nivel de conocimiento y actitudes sobre uso del anticonceptivo oral de emergencia en estudiantes de una Institución Educativa, Comas*,

2021.[tesis de pregrado, Universidad Privada San Juan Buastista].
Repositorio Institucional. <https://hdl.handle.net/20.500.14308/3893>

Shakya, S., Shrestha, v., Shrestha, R., Giri, U., & Shrestha, S. (2020). Knowledge, attitude and practice of emergency contraceptive pills among community pharmacy practitioners working in Kathmandu Valley: a cross-sectional study. *BMC Health Services Research*, 20(5), 699.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12913-020-05543-5>

Shamsu-Deen, Z., Sufyan, S., & Issah, F. (2021). KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BARRIERS TO THE UTILIZATION OF EMERGENCY CONTRACEPTIVES AMONG FEMALE STUDENTS OF THE UNIVERSITY FOR DEVELOPMENT STUDIES: A CROSS-SECTIONAL STUDY. *International Journal of Development*, 8(2), 596-609.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47740/601.UDSIJD6i>

Sharma, K. A., Zangmo, R., Kumari, A., Roy, K., & Bharti, J. (2020). Family planning and abortion services in COVID 19 pandemic. *Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology*, 59(6), 808-811.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tjog.2020.09.005>

Shen, J., Che, Y., Showel, E., Chen, K., & Cheng, L. (2019). Interventions for emergency contraception. *Meta-Analysis*, 1(1), CD001324.
<https://doi.org/10.1002/14651858.CD001324.pub6>

Shri, N., Singh, M., Dhamnetiya, D., Bhattacharyya, K., Jha, R., & Patel, P. (2023). Prevalence and correlates of adolescent pregnancy, motherhood and adverse pregnancy outcomes in Uttar Pradesh and Bihar. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(1), 1-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12884-023-05354-6>

Stein, R., Deverakonda, A., Katz, A., & Schmidt, E. (2022). Anticoncepción de Emergencia : Acceso y Desafíos en Tiempos de Incertidumbre. *American Journal of Therapeutics*, 29(5), 553-567.
<https://doi.org/10.1097/MJT.0000000000001560>

- Tamayo, M. (2004). *El Proceso de la Investigación científica: incluye evaluación y administración de proyectos de investigación* (4 ed.). Editorial Limusa.
<https://books.google.com.pe/books?id=BhymmEqkkJwC&printsec=frontcover&dq=metodologia+de+la+investigacion&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjT8-eEuLr9AhVUGbkGHQaWBI44UBC7BXoECAMQBg#v=onepage&q=metodologia%20de%20la%20investigacion&f=false>
- Tapia, J. (2019). *Conocimiento y actitud sobre el uso de la píldora del día siguiente en estudiantes de enfermería del instituto superior tecnológico Víctor Raúl Haya de la Torre, Barranca - 2019*[tesis de posgrado, Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion]. Repositorio Institucional. <http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/UNJFSC/3703>
- Taza, B. (2022). *conocimientos y actitudes sobre la anticoncepción oral de emergencia en usuarios atendidos en las farmacias Farmaperu. Juliaca 2021*[tesis de pregrado, Universidad Norbert Wiener]. Repositorio Institucional. <https://hdl.handle.net/20.500.13053/8528>
- Toerien, M., Zyl, V., Brisley, C., Matthysen, M., Halberg, L., & Joubert, G. (2019). The use knowledge and attitudes regarding hormonal contraceptive products of female first-year students in a Faculty of Health Sciences. *Sabinet African Journals*, 60(5), 190-196.
<https://doi.org/10.1080/20786190.2019.1643197>
- Tribunal Constitucional. (2023). Sentencia N° 00238-2021-PA/TC, Violeta Gomez. Sentencia N° 00238-2021-PA/TC. (2023, 03 30). Tribunal Constitucional, Violeta Gomez. <https://www.tc.gob.pe/institucional/notas-de-prensa/tribunal-constitucional-ordena-al-ministerio-de-salud-la-entrega-gratuita-del-anticonceptivo-oral-de-emergencia-a-niv>
- Tshitenge, S., Nlisi, K., Setlhare, V., & Ogundipe, R. (2018). Knowledge, attitudes and practice of healthcare providers regarding contraceptive use in adolescence in Mahalapye, Botswana. *African Journal Online*, 60(6), 181-186. <https://doi.org/10.4102/safp.v60i6.4928>

Universidad Tecnológica Intercontinental. (2023). *Código de ética de Investigación Científica y Tecnológica*.

<https://www.utic.edu.py/investigacion/index.php/reglamentos/codigo-de-etica-de-investigacion-cientifica-y-tecnologica>

Valdivia, G. (2019). *Conocimiento y actitud sobre el uso de la píldora de emergencia en jóvenes que asisten a una discoteca de Lima, 2018[tesis de pregrado, Universidad Alas Peruanas]*.

<https://hdl.handle.net/20.500.12990/9237>

Vargas, F., Scheiber, M., Pinedo, I., Villalba, C., & Gerometta, R. (2021).

Knowledge and uses of emergency oral contraception in fifth year students of the Medicine School of Medicine of the National University of the Northeast, in the months of August to September of the year 2020. *Revista de Investigación Científica y Tecnológica*, 5(1), 19-27.

[https://doi.org/https://doi.org/10.36003/Rev.investig.cient.tecnol.V5N1\(2021\)](https://doi.org/https://doi.org/10.36003/Rev.investig.cient.tecnol.V5N1(2021)2)

2

Velarde, M., Cachicatari, E., Imaña, N., & Mendoza, K. (2021). Sociodemographic factors and level of knowledge associated with the use of emergency contraception pills. *Revista Médica Basadrina*, 15(3), 26-30.

<https://doi.org/https://doi.org/10.33326/26176068.2021.3.1157>

Villanueva, F. (2022). *Metodología de la investigación*. Editorial soluciones

educativas S.A. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=6e-KEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n+cient%C3%ADfica&ots=WGKS3LEHdn&sig=azO25p3SdBjwY3vi6brBG2V547g#v=onepage&q=metodolog%C3%ADa%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%20cient%C3%ADfica>

Walker, T., Colayco, D., Yacobi, R., & Lawlees, G. (2019). Factors Associated with Unintended Pregnancy, Contraceptive Risk-Taking, and Interest in Pharmacist-Provided Birth Control. *Journal of Contemporary Pharmacy Practice*, 66(2), 17-26. <https://doi.org/https://doi.org/10.37901/jcphp18-00013>

Yeboah, D., Appiah, M., & Kampitib, G. (2022). Factors influencing the use of emergency contraceptives among reproductive age women in the Kwadaso Municipality, Ghana. *Plos One*, *17*(4), 1-17.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264619>

Yongpradern, S., Uitrakul, S., Daengnapapornkul, P., & Sinsangbun, B. (2022). Knowledge and attitude toward emergency contraceptive pills among first-year undergraduate students in Southern Thailand. *BMC Medical Education*, *22*(1), 593. [https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12909-022-](https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12909-022-03659-2)

[03659-2](https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12909-022-03659-2)

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de consistencia

TITULO: Conocimiento y actitud sobre la anticoncepción oral de emergencia en colaboradores de Droguerías de Capón Center en Cercado de Lima-2023.

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPOTESIS	VARIABLE	POBLACION y MUESTRA	METODOLOGIA	INSTRUMENTO
<p>Problema General ¿cómo el conocimiento se relaciona con la actitud sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023?</p>	<p>Objetivo General Conocer como el conocimiento se relaciona con la actitud sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023.</p>	<p>Hipótesis General El conocimiento se relaciona significativamente con la actitud sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023</p>	<p>Variable independiente Nivel de conocimiento</p>	<p>Unidad de análisis: Estuvo conformada por los colaboradores del centro comercial galería capón center en el distrito de Cercado de Lima.</p>	<p>Enfoque: Es cuantitativa, por su condición numérica en los datos obtenido Tipo Es básica, porque nos sirve como base teórica para otras investigaciones</p>	Encuesta/ Cuestionario
<p>Problema Especifico - ¿Cómo se relaciona la actitud con la dimensión definición sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023? - ¿Cómo se relaciona la actitud con la dimensión uso sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito</p>	<p>Objetivo específico . conocer la relación de la actitud con la dimensión definición sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023. . conocer la relación de la actitud con la dimensión uso sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de la</p>	<p>Hipótesis específico - Existe relación significativa entre la actitud y la dimensión definición sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023. - Existe relación significativa entre la actitud y la dimensión uso sobre anticonceptivos oral de emergencia en</p>	<p>Variable dependiente Actitud</p>	<p>Población: La población estuvo conformada por 208 colaboradores entre 20 a 49 años de edad del centro comercial galería capón center en el distrito de Cercado de Lima.</p> <p>Muestra: El muestreo de nuestro estudio fue mediante una</p>	<p>Diseño: El estudio es de método descriptivo-correlacional, de diseño no experimental porque no se buscó evidenciar la</p>	

<p>de Cercado de Lima-2023?</p> <p>- ¿Cómo se relaciona la actitud con la dimensión eficacia sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima?2023?</p> <p>- ¿Cómo se relaciona la actitud con la dimensión reacciones secundarias sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023?</p>	<p>galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023</p> <p>. Conocer la relación de la actitud con la dimensión eficacia sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023.</p> <p>. Conocer la relación de la actitud con la dimensión reacciones secundarias sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023.</p>	<p>colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023.</p> <p>- Existe relación significativa entre la actitud y la dimensión eficacia sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023.</p> <p>- Existe relación significativa entre la actitud y la dimensión reacciones secundarias sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de droguerías de la galería capón center en el distrito de cercado de Lima-2023.</p>		<p>muestra probabilística y se usó una fórmula para población finita dando un total de 134 participantes.</p>	<p>causa-efecto de un fenómeno, es correlacional porque se buscó mediar la relación entre ambas variables.</p>	
---	--	---	--	---	---	--

Anexo2: Operacionalización de las Variables.

VARIABLE	DEFINICION CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL	DIMENSION	INDICADOR	ESCALA DE MEDICION
Variable independiente conocimiento	El considerado el punto de partida de toda investigación científica, y se busca respuesta a las interrogantes existentes frente a diversos fenómenos (Hurtado F. , 2020)	Es la información acerca del conocimiento en los colaboradores de las droguerías sobre la anticoncepción oral de emergencia.	Definición sobre AOE	¿Cuál es la definición correcta del AOE? ¿Con que otro nombre se le conoce al AOE? -También se le define al AOE como un método. -El AOE forma parte de la Planificación familiar.	Puntaje a la respuesta: -Correcta 1 -Incorrecta 0 Valoración de conocimiento Puntaje: -Alto: 9-11 -Medio: 4-8 -Bajo: 0-3
			Uso	¿Cuándo está indicado el uso de AOE? -En el Perú es legal o ilegal el uso de la POE. ¿Con respecto al uso del AOE el tiempo prudente para tomarlo corresponde?	
			Eficacia	¿Cuál es la tasa porcentual de eficacia del Levonorgestrel antes de las 72 hora? ¿Cuál es la tasa porcentual de Método Yuzpe antes de las 72 horas?	
			Efectos secundarios	¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes al uso del AOE más? ¿Con respecto a las contraindicaciones su uso del AOE en caso?	
Variable dependiente Actitud	Es la estructura en la que los elementos tienden a encajar entre sí. Cuando estamos en disonancia, nuestra conducta cambia cuando somos expuestos a cierta información (Parales, 2020)	Es la respuesta de los colaboradores sobre anticoncepción oral de emergencia según las dimensiones que son evaluadas mediante un cuestionario.	Cognitiva	Los AOE son abortivo. Las personas deben tener mayor información sobre AOE. No deberían usarse en menores de edad No deberían usarse con frecuencia	Escala Likert: -Desacuerdo 1 -Indeciso 2 - De acuerdo 3 Valoración: -Aceptación (28- 36) -Indecisión (20 - 27) -Rechazo (12 - 19)
			Afectiva	Va en contra de los principios. Atenta contra la formación de la familia. Rechazo las personas que toman AOE Rechazo las personas que evitan tener hijos	
			Conductual	Rechazo su libre distribución. Es necesario para el control de la natalidad. De acuerdo que incentiven su uso. De acuerdo con el uso del AOE.	

Anexo 3: Instrumento de recolección de datos

Cuestionario: conocimiento y actitud sobre anticonceptivos oral de emergencia

El presente cuestionario está elaborado como parte fundamental del estudio de investigación que tiene como objetivo principal determinar el nivel de relación entre actitud y definición sobre anticonceptivos oral de emergencia en colaboradores de la galería capón center en el distrito de Cercado de Lima-2023.

Por lo cual se solicita su colaboración de manera voluntaria y toda la información recopilada será de manera anónima de antemano gracias por comprensión.

Instrucciones: marque con un aspa "X" la respuesta que considera correcta.

Datos personales

Edad:	Sexo:	Nivel de educación:
-------	-------	---------------------

I. Nivel de conocimiento sobre anticonceptivo oral de emergencia.

1. ¿Cuáles la definición correcta del anticonceptivo oral de emergencia se?
 - a) Un método abortivo
 - b) Un método para los embarazos no deseados
 - c) Un método que se usa los fines de semana
 - d) No sabe
2. ¿Con que otro nombre se conoce al anticonceptivo oral de emergencia?
 - a) Píldora de emergencia
 - b) Píldora abortiva
 - c) Píldora del día siguiente
 - d) No sabe
3. También se le define al anticonceptivo oral de emergencia como un método.
 - a) Simple, costoso e innecesario
 - b) Simple, confiable y eficaz
 - c) Simple, escaso y de uso regular
 - d) No sabe
4. El anticonceptivo oral de emergencia forma parte del programa de planificación familiar.
 - a) Si, forma parte del programa de planificación familiar
 - b) No, forma parte del programa de planificación familiar
 - c) Tal vez
 - d) No sabe
5. ¿Cuándo está indicado el uso de anticonceptivo oral de emergencia en las mujeres?
 - a) En caso de violencia sexual
 - b) Cuando se ha tenido relaciones coitales sin ningún otro método de prevención

- c) Ruptura del preservativo de látex
 - d) Todos las anteriores
6. En el Perú actualmente es legal o ilegal el uso de la píldora oral de emergencia
- a) Actualmente si
 - b) Actualmente no
 - c) Tal vez
 - d) No sabe
7. Con respecto al uso del anticonceptivo oral de emergencia, el tiempo prudente para tomarlo corresponde:
- a) Antes de las 72 horas del acto sexual sin protección
 - b) Durante las 72 horas del acto sexual sin protección
 - c) Después de las 72 horas del acto sexual sin protección
 - d) No sabe
8. ¿Cuál es la tasa porcentual de eficacia con levonorgestrel, antes de las 72 horas?
- a) 35%
 - b) 85%
 - c) 55%
 - d) 100%
9. ¿Cuál es la tasa porcentual de eficacia para método yuzpe, antes de las 72 horas?
- a) 68%
 - b) 56%
 - c) 40%
 - d) 25%
10. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes al uso de los anticonceptivos oral de emergencia?
- a) Dolor de cabeza
 - b) Mareos y vomito
 - c) Irregularidad menstrual
 - d) Todas las anteriores
11. ¿Con respecto a las contraindicaciones, los anticonceptivos orales de emergencia se deben de evitar en caso?
- a) De hipersensibilidad o alergia al método hormonal
 - b) En insuficiencia hepática
 - c) Problemas cardiacos
 - d) Todas las anteriores

II. Escala de evaluación de la actitud en los colaboradores sobre anticonceptivos oral de emergencia.

Instrucciones: Marque la respuesta con un aspa que considere la respuesta correcta.

Desacuerdo	Indeciso	De acuerdo
1	2	3

DIMENSION	N°	INDICADORES	1	2	3
Cognitiva	1	Los anticonceptivos orales de emergencia son abortivos.			
	2	Pienso que las personas deben de tener mayor información al usar AOE.			
	3	No deberían usar las píldoras de emergencia en menores de edad por los riesgos que ocasiona.			
	4	Consideró que las píldoras de emergencia no deberían ser usadas frecuentemente.			
Afectiva	5	Considero que el anticonceptivo oral de emergencia va en contra de los principios.			
	6	Siento que el anticonceptivo de emergencia atenta contra la formación de una familia.			
	7	Siento indignación que las personas recomienden el consumo de las píldoras de emergencia.			
	8	Siento rechazo por las personas que tomen la píldora oral de emergencia para no tener hijos.			
Conductual	9	Rechazó su libre distribución de las píldoras de emergencia porque solo fomenta la promiscuidad.			
	10	Es necesario su uso del anticonceptivo oral de emergencia porque sirve para controlar el índice de natalidad.			
	11	Estoy de acuerdo que los profesionales de la salud incentiven el uso de anticonceptivos oral de emergencia.			
	12	Estoy de acuerdo con el uso del anticonceptivo oral de emergencia			

Anexo 4: Grado de confiabilidad

CONFIABILIDAD

Midiendo la variable Conocimiento

Alfa de Cronbach	N de elementos
0,852	11
Buena Confiabilidad	

Midiendo la variable Actitud

Alfa de Cronbach	N de elementos
0,870	12
Buena Confiabilidad	

Anexo 5: Data consolidada de Resultados

N°	VARIABLE CONOCIMIENTO											ACTITUD											
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	2
2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
3	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1
4	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	3	3	3	3
5	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2
6	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2
9	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	3	2
10	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3
11	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	3	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2	3
12	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1
14	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3
15	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2
16	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1
17	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	3	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1
18	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2
19	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2
20	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3
21	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2
22	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1
23	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	2	3	3	2	2	2	3	2	3	2	2
24	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2

25	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	3	3	3	1	1	3	3	1	1	3	3	3
27	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	2
28	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1
29	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	2	3	2	2	2	3	3	2	2	3	2
30	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
31	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	3	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3
33	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2
34	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3
35	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2
36	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2
37	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	2
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	2
40	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	3	3	1	3	1	3	3	3
41	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2
42	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2
43	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3
44	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
46	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3
47	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	3	2
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3
50	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	2	1
51	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	3	3	2	3	2	3	2	2	3	3	3
52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	2

53	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	2	2	3	2	2	3	3	3	2	3	2	2
54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3
55	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2
56	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3	3
57	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1
58	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	3
59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2
60	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
62	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3
63	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3
64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	3	2
65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3
66	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	2	1
67	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	3	3	2	3	2	3	2	2	3	3	3
68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	2
69	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	2	2	3	2	2	3	3	3	2	3	2	2
70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3
71	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2
72	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3	3
73	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1
74	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	3
75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2
76	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2
77	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3	1	3	1	3	3	3	3	2	1	1
78	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2
79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2
80	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	3	3	3	3	2	2	1	2	2	2	1

81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	2
82	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	2	3	2	3	3	3	2	2	2	2	1	1
83	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2
84	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2
85	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3
86	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2
87	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	2	2	2	1	1	3	2	2
89	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2
90	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2
91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	1	2
92	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2	3
93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2
94	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2
95	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3
96	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1
97	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2
98	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1
99	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3
100	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	2
101	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	2	2	2	2	2	3	2	2	2
102	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3
103	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2
104	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3
105	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	2	3	2	2	3	3	3	2	3	2	3	3
106	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2
107	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3
108	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2

109	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2
110	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3
111	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1
112	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
113	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2
114	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3
115	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	2	2	2	3	2	E	3	3	2	3	2	2
116	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2
117	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2
118	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2
119	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	2	2	3	2	3	3	2	2	3	3	2
120	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3
121	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	2
122	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2
123	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
124	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2
125	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	3
126	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2
127	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2
128	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	2	3	3	2	2	3	2	2
129	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	3	3	2	3	3	2	2	2	3	2	3	2
130	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3
131	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2
132	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2
133	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	3	3	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3
134	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1

Anexo 6: Cronograma del programa experimental

ACTIVIDADES	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Idea	X															
Título		X														
Formación del Problemática			X													
Problema general y específico				X												
Objetivo general y específico					X											
Justificación					X											
Antecedentes nacionales						X										
Antecedentes internacionales							X									
Bases legales								X								
Marco teórico									X							
Hipótesis general y específica									X							
Metodología										X						
Aspectos administrativos										X						
Referencias					X	X	X	X	X							
Operacionalización de variables										X						
Matriz de consistencia													X			
Presentación del Proyecto de tesis														X	X	



Anexo 7: Fotos testimoniales



ESTABLECIMIENTO DONDE SE REALIZO LAS ENCUESTAS GALERIA CAPON CENTER.



COLABORADORES ENCUESTADOS



TABULANDO LOS RESULTADOS DE LOS ENCUESTADOS

FICHA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS

I. DATOS GENERALES

1.1 Apellidos y nombres del experto: CHURANGO VALDEZ JAVIER

1.2 Grado académico: MAGISTER

1.3 Cargo e institución donde labora: DOCENTE UNID

1.4. Título de la Investigación: CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA EN COLABORADORE DE DROGUERIA DE CAPON CENTER EN CERCADO DE LIMA 2023

1.5. Autor del instrumento: Br. BRICEÑO PASTOR SIXTO FEDERICO

1.6. Nombre del instrumento: JUICIO DE EXPERTOS UNID

INDICADORES	CRITERIOS CUALITATIVOS/CUANTITATIVOS	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Bueno 41-60%	Muy Bueno 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado.				X	
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables.				X	
3. ACTUALIDAD	Adecuado al alcance de ciencia y tecnología.				X	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.				X	
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos de cantidad y calidad.				X	
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos del estudio.				X	
7. CONSISTENCIA	Basados en aspectos Teóricos-Científicos y del tema de estudio.					X
8. COHERENCIA	Entre los índices, indicadores, dimensiones y variables.					X
9. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del estudio.					X
10. CONVENIENCIA	Genera nuevas pautas en la investigación y construcción de teorías.					X
SUB TOTAL					X	
TOTAL					X	

VALORACION CUANTITATIVA (Total x 0.20) : 80%

VALORACION CUALITATIVA: MUY BUENO

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: APLICA

Lugar y fecha: 10 de abril 2023



Javier Churango Valdez
 Químico Farmacéutico
 C.Q.F.P. N° 00750 R.N.M. N° 04
 D.N.I. N° 07403292

FICHA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y nombres del experto: MONTELLANOS CABRERA HENRY

1.2. Grado académico: MAGISTER

1.3. Cargo e institución donde labora: DOCENTE IML

1.4. Título de la Investigación: CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA EN COLABORADORE DE DROGUERIA DE CAPON CENTER EN CERCADO.

1.5. Autor del instrumento: Br. BRICEÑO PASTOR SIXTO FEDERICO

1.6. Nombre del instrumento: JUICIO DE EXPERTOS UNID

INDICADORES	CRITERIOS CUALITATIVOS/CUANTITATIVOS	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Bueno 41-60%	Muy Bueno 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado.				X	
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables.				X	
3. ACTUALIDAD	Adecuado al alcance de ciencia y tecnología.				X	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.				X	
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos de cantidad y calidad.				X	
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos del estudio.				X	
7. CONSISTENCIA	Basados en aspectos Teóricos-Científicos y del tema de estudio.					X
8. COHERENCIA	Entre los índices, indicadores, dimensiones y variables.					X
9. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del estudio.					X
10. CONVENIENCIA	Genera nuevas pautas en la investigación y construcción de teorías.					X
SUB TOTAL					X	
TOTAL					X	

VALORACION CUANTITATIVA (Total x 0.20) : 80%

VALORACION CUALITATIVA: MUY BUENO

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: APLICA

Lugar y fecha: 10 de abril 2023

Mg. Q.F. Tox. Henry S. Montellanos Cabrera
 Químico Farmacéutico
 Especialidad en Toxicología y Química Legal
 C.C.L.P. 7570, R.N.E. 030
 DNI: 25796967

FICHA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS

1. DATOS GENERALES

1.1 Apellidos y nombres del experto: HUAMAN GUTIERREZ JORGE

1.2. Grado académico: MAGISTER

1.3. Cargo e institución donde labora: DOCENTE

1.4. Título de la Investigación: CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA EN COLABORADORE DE DROGUERIA DE CAPON CENTER EN CERCADO.

1.5. Autor del instrumento: Br. BRICEÑO PASTOR SIXTO FEDERICO

1.6. Nombre del instrumento: JUICIO DE EXPERTOS UNID


INDICADORES	CRITERIOS CUALITATIVOS/CUANTITATIVOS	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Bueno 41-60%	Muy Bueno 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado.				X	
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables.				X	
3. ACTUALIDAD	Adecuado al alcance de ciencia y tecnología.				X	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.				X	
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos de cantidad y calidad.				X	
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos del estudio.				X	
7. CONSISTENCIA	Basados en aspectos Teóricos-Científicos y del tema de estudio.					X
8. COHERENCIA	Entre los índices, indicadores, dimensiones y variables.					X
9. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del estudio.				X	
10. CONVENIENCIA	Genera nuevas pautas en la investigación y construcción de teorías.				X	
SUB TOTAL					X	
TOTAL					X	

VALORACION CUANTITATIVA (Total x 0.20) : 80%

VALORACION CUALITATIVA: MUY BUENO

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: APLICA

Lugar y fecha: 10 de abril 2023


 Mg. JUAN ORLANDO HUAMÁN
 GUTIERREZ